

FORCE 500ml 22.8cm x 12 cm.

SHANGHAI E-TONG - ENE 2017

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA FICHITA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BIEN CERRADO, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino si se ingiere.
- No inhale el polvo ni el vapor.
- No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación.
- No almacenar ni transportar Jariel con alimentos, bebidas, medicinas ni bebés.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en los primeros 48 horas.
- Después de usar este producto báñase con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacene el producto en un lugar seco, ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Quemadura por Frotamiento:**
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, a llevé al paciente al médico y tráaslame la etiqueta.
- En caso de intoxicación, referir a la persona afectada a una zona ventilada, brindar respiración, si hay contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por 15 minutos.
- Si hay contacto con la piel, quítela los ropas contaminadas y lávelas con abundante agua jabón.
- En caso de ingestión administre agua, si puede deglutir, no eche el vomito si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a un persona inconsciente. Llamar al médico, conseguir asistencia médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA

CHOTIX TEL: 8-886-13849
ESMALUCES-861-1849

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el producto, envasado 1 lavar con abundante agua y lavar la etiqueta en la dirección de la flecha.
- Después de usar el producto, envasado 1 lavar con abundante agua y lavar la etiqueta en la dirección de la flecha.
- Después de usar el producto, envasado 1 lavar con abundante agua y lavar la etiqueta en la dirección de la flecha.

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros insectos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar en zonas cercanas a las abejas y otros insectos benéficos.
- No contaminar las fuentes de agua con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para aves silvestres, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos con napas freáticas.
- El uso de productos que no se han registrado en el país no debe ser autorizado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en áreas con napas freáticas superficiales o en suelos con napas freáticas.

FORCE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Formulador: 200 g/L
Aditivos: 800 g/L

Registro PQUAN° 1740 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
AGREVO ANDINA S.A.
Av. Los Fresnos 440, Urb. California, La Libertad, PERU
Teléfono: 044 810509

Fabricador:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
N°21, Lane 538, Shanghai Road, Songjiang District, Shanghai
CHINA

Contenido Neto: 500ml

Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

1. FORCE es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Piridines, afecta principalmente al sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.
- FORCE se emplea diluido en agua; preparar en pre-mezcla con la dosis recomendada en un baño, luego verter al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, aplicar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- FORCE puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (pulverizadores o pulverizadores de mochila, espolvoreadores o montados a tractor), iniciar las aplicaciones luego de un previo mantenido del cultivo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

GRUPO DE USOS		PLAZA		DOSIS		F.C. (ml)	
CULTIVO	Usos Comunes	Usos Comunes	Usos Comunes	ml/20L	Litro	7.2	1.2
Caqui	Mantener el cultivo	Protección de los frutos	Protección de los frutos	200-250	8.3-8.8	21	8.05
Papa	Cuando de los frutos	Protección de los frutos	Protección de los frutos	250	-	14	8.81
Avena	Mantener el cultivo	Protección de los frutos	Protección de los frutos	250	-	7	8.91

L.E.E.: Lente blanco de Niveles

F.C.: Periodo de Crecencia

- FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependiente de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Máximo 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FORCE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de acción sistémica.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en el envase no representan un riesgo para la salud humana y que es eficaz para los fines para los que está recomendado, al ser usado y manejado de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.