

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino si se ingiere.
- No fumar, beber o comer durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación y pasar a ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fipirotrazolo.
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada a una zona ventilada, brindar respiración.
- Nota al médico: lavado gástrico, tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítese las ropas contaminadas y lávelas con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión administrar agua, si puede deglutir, no evite el vómito si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a un persona inconsciente. Llamar al médico, conseguir asistencia médica

TELEFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA

CICOTOX TLE.: 0-800-1-3040
ESBAILUD: 0-801-1040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizado o perforado y depositado en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuorpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



FORCE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Fipronil 200 g/L
Aditivos 800 g/L

PQUA N° 1740 - SENASA

Tiular del Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO ANDINA S.A.
Av. Los Fresnos 440. Urb. California, La Libertad, PERÚ
Teléfono: 044 910509

Fabricador:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
N°21, Lane 5396, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai
CHINA

Contenido Neto: 1L

Lote
Fecha de Formulación
Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- FORCE es un insecticida que pertenece al grupo de los Feni-Pirazoles, afecta principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del doro, actúa por contacto e ingestión.
- FORCE se emplea diluido en agua; preparar un pre-mezcla con la dosis recomendada en un balde, luego verter al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- FORCE puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadores o pulverizadoras de mochila, estaciones o montadas a tractor). Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.E. (gms)
	Insecto Control	Insecto Quilón	Litro		
Espárrago	Mariposa de las brótes	Proctosporio longifolia	200-250	21	0.005
Papa	Carpio de las ardis	Phenocarpa salicaria	250	14	0.01
Arroz	Mosca minadora del arroz	Hyalella viridis	200	7	0.01

L.M.E.: Límite Máximo de Residuos. P.C.: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Mínimo 2 aplicaciones por campaña, 1 campaña al año

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

FORCE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FOTOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Tiular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las enunciadas en la etiqueta y que es eficaz para las plagas aquí recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

