

MANGANEB plus

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Mancozeb 800 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. N° XXXX-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S.A. 

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por

Hebei Sihuangji Chemical CO., LTD.

Xinji City, Hebei, China

Contenido Neto: **400 g.**

N° Lote

Fecha de Fabricación:

Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla o aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Dithiocarbamate

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta

En caso de ingestión: No inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona esta inconciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar lo ojos con abundante agua por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua fría y jabón. A continuación con agua tibia.

En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ugar con aire fresco. Brindar respiración artificial, si fuera necesario.

Antídoto: No tiene antídoto, seguir tratamiento sintomático.

Teléfono de Emergencia toxicológica:

CICOTOX 0 - 800 - 1- 3040

ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)

CIPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

"Peligroso para organismos acuáticos"

"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".

"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros".

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".

"No permitir animales en el área tratada".

"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".

"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".

"En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MANGANEB PLUS, es un fungicida, actúa por contacto inhibiendo la actividad enzimática de los hongos.

La preparación de las mezcla se realiza diluyendo la dosis indicada en 5 litros de agua aprox., agitar y verter esta pre-mezcla en un cilindro o en el equipo de aplicación que contenga la cantidad de agua necesaria.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

MANGANEB PLUS debe aplicarse de manera preventiva cuando se presenten las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de las enfermedades.

PERÍODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

MANGANEB PLUS es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo en caso de duda es recomendable efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

MANGANEB PLUS no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD		D O S I S Kg/ha	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Algodón	Mancha de la hoja	<i>Alternaria tenuis</i>	2.0	4	2
Papa, Tomate	Hielo o Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	3.0	4	0.2
Apio	Mancha de la hoja	<i>Cercospora apii</i>	2.0	4	1
Melón, Sandía, Zapallo	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2.0 a 3.0	4	1
Arroz	Helmintosporiosis (Desinfección de semilla)	<i>Helminthosporium oryzae</i>	3 a 5 g/Kg de semilla	0	1
Espárrago	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	1.5 a 2.0	28	0.1
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	600 g/ 200 L		
Alcachofa	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	1.5 a 2.5	15	0.05
Pimiento	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	1.5 a 2.5	7	2
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2.0	7	5

LMR = Límite máximo de residuos en ppm;

n/d: No determinado

