

FENTOX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin Benzoate.....50 g/Kg
Aditivos..... csp 1Kg

REG. PQUA N° 1749 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Formulado por:
ANHUI YOUNGSUN PESTICIDES CO., LTD.
Floor 19, Huiyuan Building, No. 1779,
Yanan Road, Hefei City,
Anhui Province, China.

Importado y Distribuido por:

SOCIEDAD ANONIMA *Fausto Piaggio*
Av. Guillermo Dansey 2045
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222
e-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 20 Kilos

Lote N°
F. Formulación:
F. Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Cuidado, no ingerir.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - No comer, beber, o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Avermectin
 - No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.
 - En caso de ingestión, beber abundante agua, no inducir al vómito.
 - En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.
 - En caso de contacto con los ojos: mantenga los párpados abiertos, lavar los ojos con abundante agua durante 20 minutos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: (01) 464-2222

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
 - No aplicar en época de floración del cultivo.
 - No aplicar en presencia de polinizadores.
 - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
 - Aplicar temprano en las mañanas o al atardecer.
 - Evitar la deriva por el viento.
 - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FENTOX es un insecticida de acción translaminar. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros. Pertenece al grupo de las avermectinas. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, su modo de acción es a nivel de activadores del canal de cloro

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
Agregue **FENTOX** según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente **FENTOX** en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar al observar la presencia de la plaga o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo.
Aplicar una vez por campaña y por año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingrese a las áreas tratadas durante 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CUADRO DE DOSIS Y USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/ha		
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	-	0.15	4	0.1
Arándano	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.1	-	5	0.01
Arroz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.1	7	0.01
Espárrago	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.125 - 0.150	7	0.01
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.15	14	0.01
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.07-0.1	-	14	0.01
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.2	3	0.2

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m. p.p.m.: partes por millón.

