

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
- Irritante a la piel y a los ojos. Puede causar sensibilización por contacto con la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos.
- Dañino por inhalación. Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847 ó ESSALUD: 080110200.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbon activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vomito. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.

NOTA AL MEDICO

- Antídoto: Atropina combinada con preparaciones Oxima como Toxogonin, bajo supervisión médica.
- General: Inyecte 2 a 4 mg de sulfato de atropina (para niños 0.5 a 2 mg de acuerdo a la edad) por vía intravenosa cada 5 a 10 minutos hasta que hayan signos de atropinización. El paciente debe permanecer atropinizado durante un periodo suficiente de tiempo (24 a 48 horas) para evitar el envenenamiento subsecuente debido a la resorción retardada.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase del triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**CURACRON<sup>®</sup> 500EC**

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Emulsionable - EC**

Composición

Profenofos ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

**Número de Registro: 027-96-AG-SENASA**

Titular del Registro:  
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
Av. Manuel Olguin 335, Of. 808. Urb. Los Granados, Santiago de Surco. Lima, Perú  
RUC: 20501511740  
Linea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
Calle René Descartes No 311  
Urb. Santa Raquel Zda Etapa, Ate.  
Lima - Perú.  
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:  
Syngenta S.A.  
Vía Mamonal, km. 6  
Cartagena  
Colombia



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

**1 Litro**

**syngenta<sup>®</sup>**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



Consulte con un Ingeniero Agronomo

| CULTIVO  | PLAGAS                          |                                  | DOSIS     |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
|          | NOMBRE COMUN                    | NOMBRE CIENTIFICO                | L/ha      | ml/200 L  |                |                 |
| Ají      | Acaro Hialino                   | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 0.8 - 1.0 |           | 7              | 5.0             |
| Algodón  | Gusano Mayor de la Hoja         | <i>Alabama argillacea</i>        | 1.5 - 2.0 |           | 14             | 1.0             |
|          | Gusano Menor de la Hoja         | <i>Anomis texana</i>             | 1.5 - 2.0 |           |                |                 |
|          | Pulgón                          | <i>Aphis gossypii</i>            | 1.0 - 1.5 |           |                |                 |
|          | Cigarrita Verde                 | <i>Empoasca kraemeri</i>         | 1.0 - 1.5 |           |                |                 |
|          | Perforador Grande de la Bellota | <i>Heliothis virescens</i>       | 1.5 - 2.0 |           |                |                 |
|          | Gusano Medidor                  | <i>Pseudoplusia includens</i>    | 1.5 - 2.0 |           |                |                 |
|          | Araña Roja                      | <i>Tetranychus cinnabarinus</i>  | 1.0 - 2.0 |           |                |                 |
| Cebolla  | Trips                           | <i>Thrips tabaci</i>             | 1.5       | 375       | 14             | 0.2             |
| Coliflor | Polilla de la col               | <i>Plutella xylostella</i>       |           | 300 - 350 | 14             | 0.5             |
| Frijol   | Gusano Medidor o Pejerrery      | <i>Pseudoplusia includens</i>    |           | 300 - 350 | 14             | 0.2             |
| Limón    | Minador de brotes               | <i>Phyllocnistis citrella</i>    |           | 300 - 350 | 28             | 3.0             |
| Maíz     | Gusano Cogollero                | <i>Spodoptera frugiperda</i>     | 0.4 - 0.6 |           | 14             | 0.05            |
| Papa     | Acaro Hialino                   | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 0.8 - 1.0 |           | 14             | 0.05            |

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Para obtener un control optimo y economico **Curacron<sup>®</sup> 500EC** debe ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros insectos a controlar.
- El intervalo de aplicacion puede variar entre 7 y 14 dias; sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presion de infestacion de la plaga
- Para evitar la aparicion de resistencia, se recomienda no aplicar **Curacron<sup>®</sup> 500EC** mas de tres veces consecutivas, rotandolo siempre con productos de diferente modo de accion.

COMPATIBILIDAD

- **Curacron<sup>®</sup> 500EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comunmente utilizados; en caso de duda se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

- **Curacron<sup>®</sup> 500EC**, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar al área tratada tan pronto se seque la nube de aspersión, aproximadamente 4 horas después de la aplicación.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.