

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar en producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin +Triazolo
- En caso de intoxicación, llame al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico: el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: no inducir al vomito sin supervisión medica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso se contactó con los ojos: lavar los parpados y los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

Teléfonos de emergencia
FMC LATINOAMERICA S.A.: 421-4811
CISPROQUIM 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar la fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto deber ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



AUTHORITY 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin..... **125 g/L**
Flutriafol..... **125 g/L**
Aditivos..... **c.s.p. 1 litro**

Registro PQUA Nº 1751-SENASA

Titular del Registro:
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL
Av. República de Panamá 3531
Int. 1203, San Isidro - Lima, Perú



Formulado por:

CHEMOTECNICA
Pbro. Juna G. Gonzales y
Aragon - (B1812EZE) Carlos Spegazzini,
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Importado y distribuido por:

 **Farmex**
Vinculos fértiles
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 L

Nº Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AUTHORITY 250 SC, con ingredientes activos Azoxystrobin y Flutriafol, pertenecen a la familia química de los estrobilurinas y triazoles respectivamente. **AUTHORITY 250 SC** tiene acción sistémica, traslaminar y contacto.

Aplicar **AUTHORITY 250 SC** cuando no se prevean lluvias, de tal manera que no se produzca lavado del producto y se dé un tiempo seco suficiente para que el producto se adhiera a la planta y pueda generar controles satisfactorios.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	N. común	N. científico			
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0,5	7	3 ¹ 0.3 ²
Arroz	Pudrición de la vaina	<i>Sarocladium oryzae</i>	0,4-0,5	28	5 ¹ 1.5 ²

1. Azoxystrobin 2. Flutriafol

P.C.: Periodo de carencia **LMR:** Límite máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
AUTHORITY 250 SC será usado en el control de podredumbre gris *Botrytis cinerea* en el cultivo de Tomate. Se realiza 1 aplicación durante la floración o formación del fruto, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realizar maximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.
Para el control de la pudrición de la vaina en el cultivo de arroz se sugiere realizar una aplicación por campaña al momento del hinchamiento de la panícula o embuchamiento procurando tener una muy buena cobertura del follaje.

PERIODO DE REINGRESO: Periodo entre la aplicación y el ingreso al area tratada: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: No se ha demostrado ninguna incompatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD: **AUTHORITY 250 SC** no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

AG00000000-00000000-2001



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: **Authority 250SC - Etiqueta Botella 1L - Perú - FORMATO: 290 x 160 mm**
CÓDIGO: **A00000000-00000000-2001 LBL BTL AUTHORITY 1L PERU**
IMPRESIÓN: **P. 293C / P. 199C / P. 343C / P. 287C / CMYK - FECHA: 28/07/2020**
RAZÓN DEL CAMBIO: **Ampliación de uso Arroz**

PANTONE 293C
PANTONE 199C
PANTONE 343C
PANTONE 287C
Logo Farmex en C,M,Y,K