

287 mm

Tamaño de letra: 7 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada antes de las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiase, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Isoxazolidinona
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón, retirar la ropa y calzado contaminado.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No se conoce antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Command®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Clomazone 480 g/L

Aditivos csp 11

Registro PQUA N°1756-SENASA

Titular del Registro:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208,
Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los
Incas. Santiago de Surco. Lima, PERÚ

Formulador:

FMC Corporation

2929 Walnut St. Filadelfia, PA 19104
Estados Unidos

Importado y distribuido por:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERU

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO: 1 L

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

®FMC y COMMAND son MARCAS
registradas de FMC Corporation.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

COMMAND es un herbicida para el control de malezas gramíneas en el cultivo de arroz, caña de azúcar y tabaco.

En el cultivo de Arroz:

Para aplicaciones en Almacigos, completar con agua hasta el nivel indicado (500 ml); agitar y proceder a la aplicación normal tipo "botellita" sobre los almacigos recién voleados con la semilla, pero siempre sobre una lámina de agua que es la que se usa normalmente para el voleo de la semilla.

Para aplicaciones de siembra directa aplicar COMMAND inmediatamente después de sembrada y tapada la semilla; sea antes o después del riego de germinación, y antes de la emergencia de las malezas.

Para aplicaciones antes y después del transplante: en el caso de Arroz aplicar inmediatamente después del transplante. En el caso de Tabaco aplicar antes del transplante hasta un máximo de 2 días antes de la emergencia de las malezas.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli	0.75 - 1.0	N.A.	0.02
	Mazorquilla	Ischaemum rugosum			
	Cebadilla	Echinochloa colonum			
	Pajilla	Leptochloa spp.			
	Caminadora	Rottboellia spp.			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Pajilla	Chloris spp.			
Caña de Azúcar	Rabo de zorro	Setaria spp.	1.0 - 1.5	N.A.	0.01
	Arrocillo	Rottboellia spp.			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Cebadilla	Echinochloa colonum			
	Mazorquilla	Ischaemum rugosum			
	Moco de pavo	Echinochloa crusgalli			
	Pata de gallina	Eleusine indica			
	Rabo de zorro	Setaria spp.			
Tabaco	Yuyo	Amaranthus dubius	1.0	N.A.	0.01
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Gramma china	Sorghum halepense			
	Coquito	Cyperus rotundus			

PC = Período de carencia; LMR = Límite máximo de residuos; N.A. = No Aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar COMMAND (i.e. Clomazone) una aplicación por campana como máximo, considerando una campaña al año para los cultivos de arroz, caña de azúcar y tabaco. Se recomienda las aplicaciones de COMMAND en pre-emergencia de malezas.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: COMMAND es compatible con Atrazina. Sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

FITOTOXICIDAD: COMMAND no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

PE_RT - Rev02 - 25/03/21

Tamaño dos pictogramas: 11 x 11 mm

	Produto: RT - Command - 1 L - PE	CORES:	
	SKU label atual: n/a	PRETO	 Cores em CMYK
	SKU label novo: n/a	PANTONE Yellow C	
	Revisão: Rev02 - 25/03/21 - Job: 049/20	PANTONE 347 C	
	Formato: 287 X 150 mm	PANTONE 287 C	
(11) 4321-3463		PANTONE 199 C	
Alterações: Atualização de la Dirección FMC Latinoamérica (02/02/21 - Ana).			