

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de cuidado, no ingerir.

No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo Químico: Pirazol-carboxamida.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto, si estuviese presentes, y continúe enjuagando el ojo. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, si está disponible con polietilenglicol 400 y a continuación con abundante agua. Si los síntomas persisten llame a un médico.

En caso de intoxicación por ingestión, enjuáguese la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

En caso de intoxicación por inhalación, Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

-Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN: (Líneas gratuitas)

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMIM: 0800-50847

ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Emesto[®]
Prime

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada para Semillas (FS)

Composición:
 Penflufen, 240 g/L
 Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N°1770-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
 Paseo de la República 3074
 Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Bayer S.A.
 Av. Américas 57-52
 Bogotá D.C. - Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
 Paseo de la República 3074
 Piso 10 San Isidro
 Lima - Perú

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 1 Litro

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Emesto prime es un fungicida formulado para utilizarse exclusivamente en el tratamiento de semillas. Es un nuevo fungicida que actúa a nivel de la cadena respiratoria del patógeno en las mitocondrias, inhibiendo la síntesis de Succinato deshidrogenasa.

Preparación de la mezcla: Agite el producto antes de utilizarlo. Se recomienda hacer una mezcla de la dosis recomendada por cultivo y aplicar al momento de la siembra sobre los tubérculos en la hilera de siembra o mediante inmersión de los tubérculos en la solución por un tiempo de 5 minutos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha	ml/100 kg semilla	%		
PAPA	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	0.75	--	--	N.a	N.a
FREJOL	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	--	60-80	--	N.a	N.a

PC = Período de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos N.a= No aplica por ser tratamiento de semillas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar directamente a la semilla antes de la siembra. Realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Al tratarse de un producto para el tratamiento de semillas se puede ingresar al campo inmediatamente después de la siembra.

COMPATIBILIDAD:

No mezcle con agua que tenga pH debajo de 3 o arriba de 8.5.

FITOTOXICIDAD:

A la dosis recomendada el producto no es fitotóxico para la semilla.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

