

9 cm

25.3 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No apilar más de 6 cajas en almacén.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de Emergencias llamar a: **CICOTOX** Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o **ESSALUD** Telf.: 423-7600
- En caso de ingestión: No administrar líquidos, provocar vómitos si el paciente esta conciente con jarabe de ipecacuana o suministrando el contenido de 1 ó 2 vasos de agua tibia con sal e introduciéndole el dedo en el fondo de la garganta.

Nota al médico: BIDRIN 85 es un inhibidor de la colinesterasa. La atropina es el antídoto de urgencia. En todos los casos de intoxicación grave inyectar sulfato de atropina lo antes posible y preferentemente por vía endovenosa: 2 - 4 mg para los adultos (0.04 - 0.08 mg/kg de peso para niños) y repetir cada 3 - 10 minutos (con dosis de 2 mg para adultos y 0.04 mg/kg de peso para niños), hasta obtener una atropinización adecuada que se evidencia por la dilatación de las pupilas, el enrojecimiento de la piel y sequedad de la boca. Si es preciso inyectar por vía muscular, tener cuidado de no exceder la dosis. De ser posible, al comienzo del tratamiento administrar también oxima como 2-PAM, P25 (CONTRATHION) o TOXOGONIN, según las instrucciones del FABRICANTE. Están contraindicados la morfina y otros opiáceos. Mantener despejadas las vías respiratorias y vigilar la respiración. Puede ser necesaria la respiración artificial. Mantener al paciente hospitalizado y en observación durante 24 horas, por lo menos.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

BIDRIN 85

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Dicrotophos 820 g/L
Emulsificantes 180 g/L

Reg. N° 221-96-AG-SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima, Perú. Telf.: 501-1000

FABRICADO POR: AMVAC CHEMICAL CORP.
4100 East Washington Blvd, LA, California, EEUU.

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 ml

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

BIDRIN 85, es un insecticida sistémico organofosforado con potente acción estomacal y largo poder residual.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

No aplicar 28 días antes de la cosecha.
No aplicar más de tres veces por campaña.
Limitar su uso solo a los cultivos y plagas registradas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	P L A G A S		D O S I S ml/ ha	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	300	28	0.05
	Pulgones	<i>Aphis sp</i>	200	28	

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y la densidad de la plaga. Aplicar con las primeras infestaciones o poblaciones bajas de la plaga. Repetir cada 7 a 10 días si fuera necesario de acuerdo al grado de infestación de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

Nocivo para el ganado, manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 7 días después de la aplicación. No aplicar en cultivos en etapa de maduración, sobre todo en cosecha.

COMPATIBILIDAD

BIDRIN 85, es compatible con la gran mayoría de agroquímicos de uso común, evitar la mezcla con productos de reacción ácida o alcalina, incluyendo el caldo bordelés. Realizar una mezcla de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos señalados, si se aplica conforme a las recomendaciones dadas en la etiqueta. Si se tiene dudas hacer una aplicación de prueba en unas pocas plantas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

