

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Almacene el producto en un lugar fresco, seco, y seguro, fuera del alcance de los niños. No apilar más de 6 cajas en almacén.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX 0800-13040 (24 HORAS) ó ESSALUD Telf.: 423-7600.**

En caso de ingestión: No administrar líquidos, provocar vómitos si el paciente está conciente con jarabe de ipecacuana o suministrando el contenido de 1 ó 2 vasos de agua tibia con sal e introduciéndole el dedo en el fondo de la garganta.

Nota al médico: **BIDRIN 85** es un inhibidor de la colinesterasa. La atropina es el antídoto de urgencia. En todos los casos de intoxicación grave inyectar sulfato de atropina lo antes posible y preferentemente por vía endovenosa: 2-4 mg para los adultos (0.04-0.08 mg/kg de peso para niños) y repetir cada 3-10 minutos (con dosis de 2 mg para adultos y 0.04 mg/kg de peso para niños), hasta obtener una atropinización adecuada que se evidencia por la dilatación de las pupilas, el enrojecimiento de la piel y sequedad de la boca. Si es preciso inyectar por vía intramuscular, tener cuidado de no exceder la dosis. De ser posible, al comienzo del tratamiento administrar también una oxima como 2-PAM, P'S (CONTRATHION) o TOXOGONIN, según las instrucciones del FABRICANTE. Están contraindicados la morfina y otros opiáceos. Mantener despejadas las vías respiratorias y vigilar la respiración. Puede ser necesaria la respiración artificial. Mantener al paciente hospitalizado y en observación durante 24 horas, por lo menos.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o

BIDRIN 85

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Dicrotophos820 g/l
Emulsificantes180 g/l

"Reg. N° 221-96-AG-SENASA"

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,

Magdalena del Mar, Lima

Telf.: 501-1000 / Fax: 262-8403



FORMULADO POR: AMVAC CHEMICAL CORP.

4100 East Washington Blvd, LA, California, EEUU.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 200 Litros



NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

® Marca Registrada



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIDRIN 85 es un insecticida sistémico organofosforado con potente acción estomacal y largo poder residual.

No aplicar 28 días antes de la cosecha.

No aplicar mas de tres veces por campaña por cultivo.

Limitar su uso solo a los cultivos y plagas registradas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS ml/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	330	28	0.05
	Pulgones	<i>Aphis sp</i>	200	28	

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y la densidad de la plaga.

Aplicar con las primeras infestaciones o poblaciones bajas de la plaga.

Repetir cada 7 a 10 días si fuera necesario de acuerdo al grado de infestación de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

Nocivo para el Ganado, manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 7 días después de la aplicación.

El reingreso al área tratada será de 6 días después de la aplicación.

No aplicar en cultivos en etapa de maduración, sobretodo en cosecha.

COMPATIBILIDAD

BIDRIN 85 es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común, evitar la mezcla con productos de reacción ácida o alcalina, incluyendo el caldo bordelés. Realizar una mezcla de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos señalados, si se aplica conforme a las recomendaciones dadas en la etiqueta. Si se tiene dudas hacer una aplicación de prueba en unas pocas plantas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

