

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
BACTERICIDA-FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Peso molecular:
249.65

Persistencia de la espuma: 0 ml de espuma luego de 1 minuto

NO EXPLOSIVO

Botellas plásticas de 250 ml, 500 ml, 1 litro, 4 litros, 20 litros y 200 litros.



- Grupo químico: Compuesto inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de soporte.

● TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX 0800-1-3040; INFOSALUD 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. (01)641-0000



1

2

3

En los cultivos de arándano, mandarina y palto hacer las aplicaciones al suelo húmedo en "drench", asegurando un buen mojado del área de desarrollo radicular.



Palto: Desde desarrollo vegetativo hasta fructificación, o después de cosecha. Aplicar preventivamente hasta no más de 5% de incidencia. Dejar un intervalo mínimo de 45 días entre aplicaciones.

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

No usar tanques de acero galvanizado para la mezcla, usar plástico, acero inoxidable o bronce.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.80*	N.A.	N.A.
Arroz	Pudrición del grano	<i>Burkholderia glumae</i>	1.0 - 1.5	N.A.	N.A.
Banano	Pudrición blanda	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	0.80	N.A.	N.A.
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.75	N.A.	N.A.
Mandarina	Gomosis del cuello	<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i>	0.50*	N.A.	N.A.
Mango	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.60	N.A.	N.A.
Palto	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.40*	N.A.	N.A.
	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.50*		

P.C.: Periodo de Carenia LMR : Límite Máximo de Residuos
*Aplicación en "drench" N.A. : No Aplica

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Puede ocurrir fitotoxicidad cuando se emplea en mezcla con productos a base de Fosetyl-Al.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



4

5

6

Dimensiones: 300 mm x 105 mm