

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un ambiente fresco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, medicinas, bebidas o forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Compuesto inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de soporte.
- **Teléfonos de Emergencia:** SAMU 106; CICOTOX: (01) 328-7700  
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. (01) 641-0000

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en a mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.



# Mastercop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

BACTERICIDA-FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Sulfato de cobre pentahidratado ..... 252 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1766-SENASA

Titular del Registro,  
Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 306.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:  
**INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**  
Carretera a Tecuailtitan Km. 0.676,  
San Miguel de Zapotitlan,  
Poncitlan, 45977  
Jalisco - México

Contenido neto: **500 ml**

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Mastercop es un bactericida -fungicida preventivo y curativo, de acción multisitio sobre los patógenos. Mastercop se aplica con equipo de pulverización terrestre. Ajustar el pH de la solución entre 5.5 - 6.5. Para las aplicaciones en "drench", hacer la aspersión sobre suelo húmedo, asegurando un buen mojado del área de desarrollo radicular.

Consulte con un ingeniero agrónomo

| CULTIVO   | PLAGA                 |                                         | DOSIS<br>(L/200L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común          | Nombre científico                       |                   |              |              |
| Arándano  | Podredumbre radicular | Phytophthora cinnamomi                  | 0.80*             | N.A.         | N.A.         |
|           | Muerte regresiva      | Lasiodiplodia theobromae                | 0.80              |              |              |
| Arroz     | Pudrición del grano   | Burkholderia glumae                     | 1.0 - 1.5         | N.A.         | N.A.         |
| Banano    | Pudrición blanda      | Pectobacterium carotovorum              | 0.80              | N.A.         | N.A.         |
| Cebolla   | Mildiu                | Peronospora destructor                  | 0.75              | N.A.         | N.A.         |
| Mandarina | Gomosis del cuello    | Phytophthora nicotianae var. parasitica | 0.50*             | N.A.         | N.A.         |
| Mango     | Muerte regresiva      | Lasiodiplodia theobromae                | 0.60              | N.A.         | N.A.         |
| Palto     | Podredumbre radicular | Phytophthora cinnamomi                  | 0.40*             | N.A.         | N.A.         |
|           | Muerte regresiva      | Lasiodiplodia theobromae                | 0.50*             |              |              |
| Vid       | Muerte regresiva      | Dactylonectria macradidima              | 0.50              | N.A.         | N.A.         |

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia

\*Aplicación en "drench"

N.A.: No Aplica

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 230 mm x 120 mm  
Esta etiqueta tiene Hoja Informativa