

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- No se ingiera; es moderadamente irritante a los ojos
- No lo transporte ni almacene junto con personas, animales, alimentos, medicinas de uso humano, ni con forrajes u otro tipo de alimentos para animales
- No coma, ni beba, ni fume durante la preparación o aplicación.
- Después de la aplicación, lávese las manos con jabón y quítese la ropa contaminada.
- Almacenese en un lugar seco y sombreado.
- Evite la rotura de los envases y destruya este después de la aplicación.
- Utilizar el equipo de protección personal: ropa protectora (camisa y pantalón de mangas largas), delantal y botas de caucho, guantes, gafas de protección ocular y respiratoria.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Evitar el contacto con la piel o ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cloroacetanilida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Solicitar atención médica para los ojos.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Σ Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Σ Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Σ Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ANTÍDOTO:

No tiene. Aplicar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

En condiciones normales de uso, CHEM RICE 60 EC no es tóxico para vertebrados e invertebrados, pero por principio elemental de prudencia no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos.

Chem-RICE[®] 60 E.C.

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN

Butachlor.....600 g/L
Aditivos.....csp 1L

Registro N° 444-97-AG-SENASA

Titular de Registro y Formulador:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 614-1500, Fax: 614-1517

FARMAGRO S.A.

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Lote:

Contenido Neto: 4L

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Chem-RICE 60 E.C., es un herbicida pre-emergente altamente selectivo al cultivo de arroz, de largo poder residual, baja toxicidad y fácil aplicación. Controla la mayoría de las malezas frecuentes en los arrozales.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz (de siembra directa y de transplante)	Moco de Pavo	<i>Echinochloa crusgalli</i>	3 a 4	60	1
	Gramma de lefe o chapatolla	<i>Echinochloa colonum</i>			
	Pajilla	<i>Leptochloa uninervia</i>			
	Piso	<i>Eleocharis spp.</i>			
	Florcita o botoncito	<i>Eclipta alba</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Correhuela	<i>Ipomoea quinquefolia</i>			
	Mazorquilla	<i>Ischaemum rugosum</i>			

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm; n.a.= No aplicable

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Arroz de siembra directa :

Efectue el riego de germinación y aplique con una pulverizadora el herbicida Chem-RICE 60EC a razón de 3 a 4 litros/ha. por lo menos 2 días después del riego o lluvia, sobre terreno húmedo. Si hay malezas emergidas de 2 a 3 o mas hojas mezclarlo con un herbicida post-emergente. Recomendamos aplicar solo sobre semilla cubierta.

Arroz de transplante:

A. Aspersión: Aplique Chem-Rice 60 EC. a la dosis de 3 a 4 litros/ha. antes que las malezas hayan comenzado a emerger sobre la lamina de agua de 5 a 10 cm. de profundidad.

B. Aplicación tipo “botella”: aplicar sobre una lamina de agua de 5 a 10 cm. de profundidad entre 1 a 14 días después del transplante, siempre y cuando la maleza no haya emergido.

Nota: en todos los casos el agua NO debe circular entre las pozas por lo menos 48 horas después de la aplicación. En lugares de alta temperatura como en el caso de selva usar menos dosis.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: Puede ser aplicado con otros herbicidas para aumentar su espectro de control, realizar una prueba de compatibilidad previamente.

FITOTOXICIDAD: **Chem - Rice 60EC** no presenta efectos fitotóxicos si se aplica en los cultivos, forma y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

