

1 cm
Sin UV

CICLON 500ml 22.8 x 12 cm COEX 02.12.21

1 cm
Sin UV

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica para los ojos.
- ANTIDOTO: Sulfato de Atropina de 0.5 a 1 mg, dosis que puede repetirse si fuera necesario según prescripción médica. Jamás administrar leche, aceite u otra sustancia oleaginosas a los intoxicados.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 500 / CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En condiciones normales de uso, **CICLON** no es tóxico para organismos acuáticos, pero por principio elemental de prudencia no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. **CICLON** es tóxico para abejas.
- No aplicar en época de plena floración.
- Evitar aplicar en horas de mayor afluencia de abejas.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Dimethoate 500 g/L

Aditivos c.s.p 1L

Registro N° 111-96-AG-SENASA

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

A.v Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochiri - San Antonio
Central: (01) 614 1500



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 500ml

Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



© Marca registrada de FARMAGRO S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **CICLON** es un insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto, actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa a nivel de sistema nervioso, produciendo acumulación de acetilcolina, causando la muerte del insecto por cansancio muscular. Actúa contra insectos picadores, chupadores como: pulgones, mosca minadora que atacan cultivos citados en el cuadro de usos

Se debe preparar agregando la dosis de **CICLON** en un poco de agua y agitar, completarlo con agua hasta el volumen deseado agitando constantemente.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	%	mL/100L		
APIO PAPA ARVEJA MELÓN	Mosca Minadora	Liriomyza spp.	0.125	125	7 14 14 3	2 0.2 2 1
	Pulgones	Aphis gossypii	0.1	100	14	0.1
	Trips	Thrips tabaci	0.25	250	20	0.02
MANDARINA	Queresas coma	Lepidosaphes beckii	0.1-0.125	100-125	14	5

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar la aplicación de **CICLON** cuando la infestación se encuentra dentro del nivel de daño económico. Se puede repetir la aplicación después de 7 a 10 días dependiendo del nivel de infestación. El número máximo de aplicaciones es 2.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: **CICLON** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común excepto con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: **CICLON** no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

