

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Evítase el contacto con los ojos, piel y boca. Use equipos de protección para las aplicaciones, como guantes, máscaras botas de jebe y anteojos.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- Si es ingerido provocar el vómito hasta que se arroje el veneno.
- En caso de emergencia llamar gratis a:

**CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 117**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Es peligroso para abejas.

RAYOSAC-HORTUS 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Permethrin 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. N°: 518-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:


**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd**
Town South Donghua Distric,
Longyou County Zhejiang, China
Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:


Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAYOSAC-HORTUS 50 EC, es un insecticida piretroide con acción de contacto, ingestión, repelencia y antialimentaria. RAYOSAC-HORTUS 50 EC, tiene un amplio espectro de acción. Controla principalmente adultos y larvas de lepidópteros, coleópteros, dípteros y homópteros en cultivos como: Algodón, tomate, ají, papa, alfalfa. Se caracteriza por presentar una rápida acción de contacto (Knock Down) y un largo efecto residual. RAYOSAC-HORTUS 50 EC, no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor emulsión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, agitando el contenido y luego completar el volumen del tanque aplicador.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/ 200 L	%		
Algodón	Gusano de la hoja	Anomis texana	60 - 80	0.3 - 0.4	7	0.5
	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	80 - 100	0.4 - 0.5		
	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus	80 - 100	-		
Tomate	Polilla	Scrobipalpa absoluta	100	0.5	7	1
	Gusano de la hoja	Spodoptera sp	80 - 100	0.4 - 0.5	7	1
Aji	Perforador del Fruto	Symmetrischema capsicum	100	0.5		
	Polilla de tubérculos	Phthorimaea operculella	100	0.5	7	1
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	100	0.5	7	0.5
	Caballada	Anticarsia gemmatilis	100	0.5	ND	ND
Páprika	Perforador del fruto	Heliothis virescens	100	0.5	ND	0.05
Alcachofa	Gusano de hoja	Spodoptera frugiperda	150	0.75	ND	0.05

PC: Período de Carencia en días. %: Partes por mil. LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar a la infestación del campo de cultivo. En ataques severos repetir cada 10 a 15 días dependiendo de la presión de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo de cultivo tratado.

COMPATIBILIDAD: RAYOSAC-HORTUS 50 EC, es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. No es compatible con preparaciones de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

v20161226



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

