

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-13040 (gratuito).
ESSALUD: 0-801-10200 (gratuito).



Contenido Neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

v20161220

TOPEXATIN 600 F

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición :

Cyhexatin.....600 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. N° 487-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:
 anasac
Almirante Pastene 300
Providencia. Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:
 hortus
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Tel: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
RUC. 20101637221
RU N° 141097

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPEXATIN 600 F es un acaricida derivado del estaño, específico para el control de formas móviles de ácaros (ninfas y adultos) que actúa por contacto e ingestión, con un marcado poder residual de hasta 21 días. En cultivos de alta cobertura y frutales usar altos volúmenes de agua para las aplicaciones (1000 a 2000 l/ha). No mezclar con aceites emulsionables, dejar pasar entre una aplicación de aceite y **TOPEXATIN 600 F** o viceversa como mínimo 15 días. No se recomienda aplicar en cítricos durante el período de floración hasta fruto joven. Se recomienda no adicionar adherente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Manzano	Arañita roja	<i>Panonychus ulmi</i>	40 - 80	18	2
Limonero	Ácaro del Tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	45 - 90	18	2
Algodonero	Arañita roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	18	2
Alfalfa	Ácaro de dos manchas	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 90	18	0.2
Frijol	Arañita roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	18	0.5
Sandía	Arañita roja	<i>Paratetranychus spp.</i>	50 - 100	18	0.2
Fresa	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	100 - 120	N.D.	0.01

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

