

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-13040 (gratuito).
ESSALUD: 0-801-10200 (gratuito).



Contenido Neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

v20161220

TOPEXATIN 600 F

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición :

Cyhexatin.....600 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. N° 487-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd
Town South Donghua Distric,
Longyicu County Zhejiang, China
Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax:718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TOPEXATIN 600 F es un acaricida derivado del estaño, específico para el control de formas móviles de ácaros (ninfas y adultos) que actúa por contacto e ingestión, con un marcado poder residual de hasta 21 días. En cultivos de alta cobertura y frutales usar altos volúmenes de agua para las aplicaciones (1000 a 2000 l/Ha). No mezclar con aceites emulsionables, dejar pasar entre una aplicación de aceite y **TOPEXATIN 600 F** o viceversa como mínimo 15 días. No se recomienda aplicar en cítricos durante el período de floración hasta fruto joven. Se recomienda no adicionar adherente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A S		DOSIS ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Manzano	Arañita roja	<i>Panonychus ulmi</i>	40 - 80	18	2
Limonero	Ácaro del Tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	45 - 90	18	2
Algodonero	Arañita roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	18	2
Alfalfa	Ácaro de dos manchas	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 90	18	0.2
Frijol	Arañita roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	18	0.5
Sandia	Arañita roja	<i>Paratetranychus spp.</i>	50 - 100	18	0.2
Fresa	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	100 - 120	N.D.	0.01

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

