

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**SUPRIMER 50 WG** es un fungicida con propiedades protectantes, curativas, erradicantes y sistémicas.

Es absorbido por las raíces y trasladado por el xilema a los tallos y hojas, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en el hongo. Inhibe la germinación de las esporas, crecimiento del micelio y la producción de esporas del hongo

**SUPRIMER 50 WG** puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre, usando suficiente cantidad de mezcla para asegurar un buen cubrimiento del cultivo.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivos	Enfermedad		Dosis	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	g/ Ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	200	7	5

PC: Período de carencia.

LMR: Límite máximo de residuos.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar las aplicaciones de manera preventiva o en los estadios iniciales del desarrollo de la enfermedad. No realizar más de 3 aplicaciones por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**SUPRIMER 50 WG** es compatible con la mayoría de los Plaguicidas de uso común. Se recomienda elaborar una pre-mezcla en pequeña escala para estudiar compatibilidad con otros productos.

#### FITOTOXICIDAD

**SUPRIMER 50 WG** no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si de usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

