



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 989 - SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo; Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 200 g

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa moderada irritación a los ojos.
- El producto es irritante al aparato respiratorio, evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Strobilurinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavar el área afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar nada a una persona inconsciente, llamar al médico.
- En caso de inhalación retirara al afectado de la zona tratada aun lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario.
- No dar de beber nada cuando la persona afectada se encuentra inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 CISPROQUIM: 0800-50847
CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO: 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPRIMER 50 WG es un fungicida con propiedades protectantes, curativas, erradicantes y sistémicas. Es absorbido por las raíces y translocado por el xilema a los tallos y hojas, actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en el hongo. Inhibe la germinación de las esporas, crecimiento del micelio y la producción de esporas del hongo.

SUPRIMER 50 WG puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre, usando suficiente cantidad de mezcla para asegurar un buen cubrimiento del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/200L		
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	0.2	-	7	5
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.2	-	14	2
Mandarina	Mancha negra de la hoja	Alternaria alternata	-	0.025	N.D.	15
Arándano	Cabeza de clavo	Alternaria tenuissima	0.3-0.35	-	0	5
Pallo	Cladosporium	Cladosporium herbarum	0.5	-	28	0.01

PC: Periodo de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos expresado en ppm
N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar las aplicaciones de manera preventiva o en los estadios iniciales del desarrollo de la enfermedad: para alcachofa y vid no realizar más de 3 aplicaciones por campaña. En arándano realizar máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SUPRIMER 50 WG es compatible con la mayoría de los Plaguicidas de uso común. Se recomienda elaborar una pre-mezcla en pequeña escala para estudiar compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

SUPRIMER 50 WG no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

