


Lima, 17 de Agosto del 2015

NEO N° 236 – 2015 DR

Señores:

Sub-Dirección de Insumos Agrícolas
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Ministerio de Agricultura y Riego



Asunto: KIETO 150 WG (i.a. Emamectin benzote, lufenuron)

Referencia:


Carta N° 3679-2015-MINAGRI-SENASA-DIAIA-SIA
D15000064080


De nuestra consideración:


Nos dirigimos a su despacho para enviar la respuesta a las observaciones indicadas en el documento de la referencia de nuestro producto KIETO 150 WG en la cual adjuntamos la etiqueta correspondiente.

Sin otro en particular y agradeciendo anticipadamente la atención a la presente, nos despedimos.

Atentamente,


Manuel A. Tuesta Aguiar
DNI: 10215887
APODERADO

NEOAGRUM S.A.C.

MARIA CATALINA VARGAS DEXTRE
APODERADO


Ing. Alcibiades Loayza Barrios
Asesor Técnico

KIETO®

150 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectín benzoate.....	50 g/kg
Lufenuron.....	100 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 1203 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neagrums

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 25 Kg

F. de Form.:

N° de Lote:

F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o si es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reanudar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupos Químicos: Avermectín + Benzoylurea.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítase la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0606 - 13348 o 328-7393
ESSALUD: 0861 10203 o 411 6060 (opción 4)
CISPROQUIM: 6803-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y arácnidos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a tratar o en cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.

- Regresar una banda de no aplicación hacia chorros de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En el caso de derrames el producto debe ser recolectado inmediatamente y depositado en un lugar seguro.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KIETO® 150 WG es un insecticida que actúa por ingestión con un ligero efecto de contacto, empuja Emamectín benzoate, insecticida con un marcado efecto translocador, el cual genera depósito de emamectín en el revés de las hojas tratadas, esta insecticida al ser ingesta actúa sobre dos receptores para amparar generando un flujo constante de iones cloro afectando el sistema neuromuscular del insecto.

KIETO® 150 WG además contiene Lufenuron, ingrediente activo altamente lipofílico que le da una gran persistencia sobre la superficie foliar, esta insecticida por ingestión reduce la síntesis de la quitina de las primeras estadios larvales interfiriendo en el proceso de la muda.

KIETO® 150 WG por su alta residualidad y sus dos ingredientes activos es un producto muy eficaz para ser usado en cualquier programa de manejo integrado de fitófagos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar KIETO® 150 WG como mínimo 2 veces por año. Iniciar las aplicaciones al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo en equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso de requerir ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

KIETO® 150 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

KIETO® 150 WG no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para las plagas aquí recomendadas, a su uso y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g / ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico			Emamectín	Lufenuron
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 - 200	14	0.01	0.02
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	10	0.01	0.05
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	100	7	0.02	1

P.C. Periodo de carencia

L.M.R. Límite máximo de residuos

