Fenprozole 500 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Difenoconazole ..... 250 g/L
Propiconazole ..... 250 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

PQUA Nº 1763 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°401 Of. 610 Santiago de Surco
Lima - Perú. Teléfono: (511) 713-9960
rainbowchem@rainbowchem.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOLANDINA PERU SAC
Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902
Urb. A. Von Humboldt , Miraflores - Lima - Perú.
Teléfono: +51960241693

Lote Nº:
Fecha Fabricación:
Fecha Vencimiento:

Contenido Neto: 250 ml

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas"
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 411-8000
Rainbow Agrosciences SAC: 713-9960

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Chupadera fungosa	*Rhizoctonia solani*	0.25–0.3*	45	Difenoconazole 3.0 Propiconazole 0.7

PC: Periodo de carencia
L.M.R: Limite máximo de residuos
*Usar la menor dosis cuando se presente baja incidencia de la enfermedad reportada y la dosis alta cuando se presenten mayores valores de incidencia.
No reingresar al campo antes de 12 horas de realizada la aplicación.