

# CONTOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

## Composición:

Imidacloprid .....700 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**PQUA N° 1357- SENASA**

## TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo 401, Oficina 610.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 713-9960  
rainbowchem@rainbowchem.com  
www.rainbowchem.com



## FORMULADO POR:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center,  
Shunhua Road 750 #, Jinan, Shandong  
China 250101. Tel: 86-531-88875230  
Fax: 86-531-88875232

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Solandina Perú SAC.  
Av. Alfredo Benavides N° 2975 Of.902  
Urb. A. Von Humboldt , Miraflores - Lima - Perú.  
Teléfono :+51960241693



**Contenido Neto: 300 g**

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas"

**PRIMEROS AUXILIOS**

**- Grupo químico: Neonicotinoide**

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

- En caso de ingestión: no inducir al vómito, mantener al paciente en un lugar protegido de la luz. No administrar nada oralmente a una persona inconsciente.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua durante 15 minutos.

- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.

- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a:

**ESSALUD: 01-411-8000 (Opción 4)**

**CISPROQUIM: 0800-50-847.**

**CICOTOX : 0800-1-3040**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CONTOR** es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión con efecto inhibidor de la alimentación del insecto. Después de su aplicación es incorporado rápidamente por la planta y presenta distribución acropétala. Se puede aplicar vía foliar o en drench.

**Preparación de la mezcla:**

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:

-Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

-La absorción de **CONTOR** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA                                |                               | DOSIS<br>Kg/200L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(mg/kg) |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
|           | Nombre común                         | Nombre científico             |                  |                |                   |
| Espárrago | Caracha<br>(mosquilla de los brotes) | <i>Prodioplosis longifila</i> | 0.08-0.10        | 7              | 0.05              |

