

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar el polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectin + Pyretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

Nota al médico:

- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y dépositelos en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

EMATRIN PLUS 150 WP es un insecticida de amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión, además de tener acción repelente y ovo-larvicia. **EMATRIN PLUS 150 WP** es una combinación de 2 ingredientes activos: emamectin benzoato y lambda-cyhalothrin los cuales complementan su acción sobre la plaga.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **EMATRIN PLUS 150 WP** cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Aplicar **EMATRIN PLUS 150 WP** para el cultivo de espárrago y pimiento hasta 2 aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 14 días entre aplicaciones y para el cultivo de palto una aplicación por campaña.

FITOTOXICIDAD

EMATRIN PLUS 150 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 L	kg/Ha		
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.15-0.2	14	0.02* 0.5**
PIMIENTO	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.2	7	0.1* 0.2**
PALTO	Plaga del espárrago	<i>Oxydia vesulia</i>	0.1-0.2	-	40	0.02* 0.01**

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenia

*Lambda-cyhalothrin

**Emamectin benzoato

EMATRIN

PLUS 150 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato _____ 50 g/kg
Lambda-cyhalothrin _____ 100 g/kg
Aditivos _____ c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° 1771 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C

Importado y Distribuido por:



Av. Melgarejo N° 580 Dpto 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina

Teléfono: 349-2669

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

