MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ΓΩΡΙ ΔΥ® 200

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

Composición:

Fipronil Aditivoscsp 1 L

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes Ningún envase que haya contenido el plaquicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Phenylpyrazoles.
- En caso de intoxicación lláme al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.
- En caso de contacto con los ojos, lavar bien los ojos con aqua limpia, por lo menos durante 30 minutos, cuidando que los parpados estén bien abiertos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si la respiración es dificultosa, ofrecer respiración artificial. Consiga atención médica si persiste la dificultad respiratoria.
- El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático o de soporte.
- Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106 / AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.: 96192584 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifca la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños
- Aplicar temprano en las mañanas o al atardecer. Evitar la deriva por el Viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FITOPLAY® 200 SC es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión.

FITOPLAY® 200 SC representa la segunda generación de insecticidas que actúan sobre el sistema receptor GABA como un bloqueante no competitivo.

FITOPLAY® 200 SC es un insecticida de aplicación foliar, utilizado para el control de las plagas indicadas en

Para la preparación llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia, luego agregar la cantidad de dosis recomendada de FITOPLAY® 200, SC revolviendo constantemente y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR	
		Nombre común		Nombre científico	L/ha	L/200 L	(días)	(ppm)
	Capsicum annuum	Mosquilla de los brotes		Prodiplosis longifila	-	0,2	21	0,005
	Cebolla	Thrips		Thrips tabaci	-	0,2	21	0,02
	Espárrago	Thrips		Thrips tabaci	-	0,2	21	0,005
		Mosquilla de brotes	los	Prodiplosis longifila	1	0,2	21	0,005

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos ppm: parte por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El momento de aplicación de FITOPLAY® 200 SC es cuando la plaga se encuentre en el cultivo con un 5% de infestación. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: FITOPLAY 9 200 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas, es compatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

FITOTOXICIDAD: FITOPLAY @ 200 SC no presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del registro, Importador y Distribuidor: AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C. Av. Juan de Aliaga Urb. Orrantia del Mar 355

Magdalena del Mar, Lima.

Teléfono: 961925844

Reg. PQUA Nº 1772 - SENASA



NO INFLAMABLE

Formulador:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd. Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

N° de Lote: F. de Form:

Contenido Neto: F. de Venc:

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO





MODERADAMENTE PELIGROSO **DAÑINO**













10 L

 $\overline{\infty}$ 90 SH