

FAKIR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

- Ingrediente activo:
Triflumizole..... 300 g/kg
- Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991,
piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE

FINE-CHEMICAL CO., LTD

9th Floor, No.58, Nanhu Road,
Nanjing, Jiangsu, China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Contenido Neto: 100 g

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, enjuague la boca inmediatamente. No dar nada por vía oral a una persona inconsciente. No inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. Si se desarrolla irritación, busque atención médica.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerlo en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua, por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.
- Teléfonos de emergencia: **CETOX: 2732318, 999072933; ESSALUD: 0801-10200; CISPROQUIM: 080-050-847**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE USO Y MANEJO

FAKIR, es un fungicida preventivo y curativo, compuesto de Triflumizole que pertenece al grupo químico de imidazoles.

El mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de ergosterol.

Utilizado principalmente para el control de oidiosis en el cultivo de vid.

MODO DE PREPARACIÓN

En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

FAKIR es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se presente los primeros síntomas. Se recomienda como máximo 2 aplicaciones/ campaña/ año, con intervalo entre aplicaciones de 7-21 días, dependiendo de una evaluación previa.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FAKIR, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	g/ha		
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.100 - 0.125	500 - 625	7	3

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

