

Gavan

FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN:

Flutriafol	500 g/L
Proxel GXL (1,2-benzisothiazol-3-one)	1.05 g/L
Aditivos	c.s.p.1Litro

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

- Este producto es DANINO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Grupo químico: Triazoles
- No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:
 CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTEC: 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro o fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Gavan 500 SC es un fungicida triazol de acción preventiva y curativa de alta solubilidad y sistemicidad que penetra a través de raíces y hojas. Aplicar dirigido al follaje, utilizando equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. La aplicación debe realizarse en condiciones climáticas favorables. Antes de aplicar realizar calibración de equipos y esperar que el rocío seque.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(mL/200L)	(L/ ha)		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	-	0.35-0.50	21	0.01
Pimiento	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.35	1	1
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	42 - 50	0.125-0.15	21	0.8

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Espárrago: Realizar una (01) sola aplicación por campaña, entre apertura de filocados hasta maduración de brotes. Considerar dos campañas al año.

Pimiento: Realizar hasta dos (02) veces por campaña, con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días, entre desarrollo vegetativo hasta fructificación. Una campaña al año.

Vid: Realizar una (01) sola aplicación por campaña, entre brotamiento vegetativo hasta desarrollo de bayas. Una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

No es compatible con sustancias fuertemente alcalinas. En caso de mezcla con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Contracara