

TIRANO[®]

**520
WP**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Metsulfuron- Methyl 20 g/kg
Quinclorac..... 500 g/kg
Aditivosc.s.p. 1 kg

REGISTRO PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500 Xinjiang Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 kg**

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

**LIGERAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Sulfonilurea + Quinoline carboxylic acid

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si lo hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040 CETOX: 01-213-2318.
ESSALUD: 0-801-10200 CISPROQUIM: 0801-050847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TIRANO 520 WP es un herbicida sistémico y de contacto, compuesto por metsulfuron-methyl + Quinclorac. Tiene mayor fitotoxicidad hacia las dicotiledonias y ciperáceas que hacia las gramíneas; actúa como regulador de crecimiento y afecta la síntesis de proteínas y aminoácidos.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **TIRANO 520 WP**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/200L de agua	Kg/Ha		
Arroz	“Pata de gallina” “Moco de pavo” “Coquito” “Cadillo”	“Eleusine indica” “Echinochloa crusgalli” “Cyperus rotundus” “Cenchrus echinatus”	0.3-0.5	--	77	Quinclorac: 5.0 Metsulfuron-methyl: 0.01

*P.C.: Periodo de carencia

**L.M.R.: Límite máximo de residuos

