ADAMA

Diler®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Clethodim.. Aditivos c.s.p.1Litro

Reg. PQUA Nº 1799-SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A. Importado y Distribuido por: **ADAMA Agriculture Perú S.A.** Av. El Derby N° 254 Of 503.

Formulado por: ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia. Calle 1C N° 7-53 Interior. Zona Franca Barranquilla, Colombia.



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


IDENTIDAD DE LA MOLÉCULA:

Nombre común: Clethodim

Nombre químico IUPAC: (5RS)-2-{(E)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2 (ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

Fórmula empírica: C₁₇H₂,CINO₂S Masa molecular: 359.92 g/mol

Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

Apariencia: Líquido ambar de ligero olor aromático. Densidad relativa: 0.96 - 0.985 g/ml

Persistencia de espuma: Máximo 60 ml después de 1 minuto.

Estabilidad en almacenamiento: Conserva sus propiedades físicas y químicas como mínimo 2 años cuando es almacenado en un lugar frío, seco y bien ventilado lejos de luz

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

CLASE Y CAPACIDAD DE LOS ENVASES

Botellas plásticas de 250 ml, 500 ml,1 litro, 4 litros, 20 litros y 200 litros



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los oios.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies, • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área
- tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar
- alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ciclohexanodionas.
- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX: 0800-13-040; INFOSALUD:0-800-10-828.



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE • Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuaticas

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya la posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en uelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MODO DE ACCIÓN

Diler 240 EC es un herbicida sistémico, post-emergente y selectivo para el control de malezas gramíneas anuales y perennes. Los primeros síntomas que se observan es el cese del crecimiento, los puntos de crecimiento se vuelven marrones y descomponen, las hojas nuevas se tornan cloróticas, las hojas viejas mueren lentamente cambiando su color a naranja, rojo o púrpura.

MECANISMO DE ACCIÓN

Diler 240 EC inhibe la formación de lípidos (acidos grasos) en las plantas , al inhibir al unirse a la enzima Acetyl Coa Carboxylasa (ACCesa). El herbicida es traslocado y acumulado en las regiones meristemáticas de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Utilizar equipos de aplicación terrestre con boquillas de abanico de 110 a 120° que produzcan gotas > 400 um, dirigiendo la aplicación hacia el follaje de las malezas. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado para evitar sobre o sub-dosificaciones del producto. Mantener una buena humedad del suelo durante la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS Nombre común Nombre científico		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre comun	Nombre cientifico	(L/200 L)	(u.us)	(PPIII)
Alcachofa	Pata de gallina Pega-pega Cadillo Grama dulce	Eleusine indica Setaria verticillata Cenchrus echinatus Cynodon dactylon	0.30	5	1.2
Cebolla			0.30	45	0.5
Espárrago			0.30	1	1.7
Pimiento			0.30	20	0.5
Vid			0.20	23	1.0

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos



MODERADAMENTE PELIGROSO

FRECUENCIAY ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos (02) aplicaciones, excepto en cebolla que se realizará una (01) sola aplicación por campaña-año.

3

Momento de aplicación

Aplicar cuando las malezas estén en activo crecimiento, entre 2 a 6 hojas verdaderas y no más de 20 cm de altura. Dejar un intervalo mínimo de 20 días entre aplicaciones **Alcachofa y Espárrago**. - Entre desarrollo vegetativo a floración.

Cebolla. - Hasta 30 días después del transplante

Pimiento. - Entre desarrollo vegetativo a fructificación.
 Vid. - Entre desarrollo vegetativo a cuajado de fruto y en plantaciones mayores a un

PERIODO DE REINGRESO

lo ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

La mezcla en tanque con herbicidas para el control de malezas de hoja ancha podría ocasionar una reducción en el efecto del control del clethodim sobre malezas gramíneas o una ligera reducción de la tolerancia del cultivo. Se recomienda, realizar una prueba a pequeña escala para determinar la compatibilidad de la mezcla a usar. Si las pruebas de compatibilidad no se han realizado dejar un intervalo de 5 días entre la aplicación de un herbicida de hoja ancha y Diler 240 EC

FITOTOXICIDAD

Diler 240 EC aplicado bajo las condiciones y dosis recomendadas no presenta riesgo de

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico auímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e





5 6