ADAMA

Diler®

240 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN
Clethodim ..... 240 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA Nº 1799-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N° 7-53 Int Zona franca
Barranquilla, Colombia.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Contenido neto: **4 LITROS**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Cara

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ciclohexanodionas
- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM : 080-050-847; CICOTOX: 0800-130-40; INFOSALUD: 0-800-10-828.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Ver Hoja Informativa adjunta.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Diler 240 EC es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente , que inhibe la síntesis de ácidos grasos, y que es recomendado contra malezas gramíneas anuales y perennes Los síntomas de control se observan entre 7 a 14 días después de la aplicación, dependiendo de la especie tratada y las condiciones ambientales.
Utilizar equipos de aplicación terrestre con boquillas de abanico de 110° a 120° que produzcan gotas de ≥ 400 um. Dirigir la aplicación al follaje de la maleza. Mantener una buena humedad del suelo durante y después de la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	Pata de gallina Pega-pega Cadillo Grama dulce	*Eleusine indica* *Setaria verticillata* *Cenchrus echinatus* *Cynodon dactylon*	0.30	5	1.2
Cebolla			0.30	45	0.5
Espárrago			0.30	1	1.7
Pimiento			0.30	20	0.5
Vid			0.20	23	1.0

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña, excepto en el cultivo de cebolla que se realizará una (01) sola aplicación. Dejar un intervalo mínimo de 20 días entre aplicaciones.
Realizar la aplicación cuando las malezas estén en activo crecimiento con 2 a 6 hojas verdaderas y no más de 20 cm de altura. Ver Hoja Informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa