

# DINOTROLE XTRA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES - SG

## COMPOSICIÓN

Dinotefuran..... 200 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1kg

Registro PQUA N°1802 - SENASA

### TITULAR DEL REGISTRO:

**RAINBOW AGROSCIENCES SAC**

Av. El Polo N° 401, Oficina 610,  
Santiago de Surco, Lima 33, Perú  
rainbowchem@rainbowchem.com  
Http://www.rainbowchem.com

### FORMULADOR:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW  
CHEMICAL CO. LTD.**

Binhai Economic Development Area  
Weifang, Shandong 262737, China.  
Tel: 86-531-88875222  
Fax: 86-531-88875232

### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Green  
Valley**

*Contigo en tu campo*

### CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC

Cal. A Mza. B Lote 9 Int. 202 Urb. Z.I.  
Pro 9no Sector  
Lima - Lima - San Martin Porres  
C: 945583602 RPM: #0330302  
www.cgreenvalley.com

N° de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**20 KG**

Contenido Neto

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

### “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35 °C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo Químico: Neonicotinoide.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

#### EN CASO DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 411-8000 anexo 4

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.: 713-9960

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DINOTROLE XTRA pertenece al grupo de los neonicotinoides, con acción sistémica y actúa por contacto e ingestión sobre los insectos, afectando su sistema nervioso, específicamente sus receptores nicotínicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte.

DINOTROLE XTRA se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

#### “CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### CUADRO DE USO

| Cultivo   | Plaga        |                      | Dosis   | PC | LMR |
|-----------|--------------|----------------------|---------|----|-----|
|           | Nombre común | Nombre científico    | Kg/Ha   |    |     |
| Espárrago | Trips        | <i>Thrips tabaci</i> | 1.0-1.5 | 21 | 0.5 |

PC: Período de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año.

Considerando 2 campañas al año. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 15 días en espárrago.

En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

DINOTROLE XTRA no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta. Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.”

