

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Evite la inhalación o el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión inducir el vómito y acudir al médico. No inducir al vómito a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: Llamar a ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

TOWER®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido cítrico.....	3.00 %
Acido láctico.....	4.13 %
Acido ascórbico.....	2.50 %
Aditivos.....	csp 1L

REG.PBA-EV N° 003-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel-2da. Etapa. Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565

Formulado por:

Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981



Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- TOWER es un fungicida sistémico. Afecta la membrana celular de los microorganismos patógenos.
- El producto se emplea en el campo, mediante método de aspersión foliar, empleando equipos de aplicación terrestre como pulverizador manual o bomba de mochila.
- Modo de preparación: llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de TOWER, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar oros cultivos con residuos.
- Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ CIL. 200 L		
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	1	NA	NA
	"Pudrición ácida"	<i>Aspergillus niger</i> <i>Penicillium digitatum</i>	0.5 -0.8	NA	NA
	"Podredumbre gris"/ "Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	NA	NA
"PALTO"	"Antracnosis"	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.5	NA	NA
"MANGO"	"Antracnosis"	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.5	NA	NA
ARANDANO	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.50 -0.60	NA	NA
"MANDARINO"	"Moho verde"	<i>Penicillium digitatum</i>	0.5	NA	NA

P.C: Período de carencia
L.M.R: Límite máximo de residuos
NA: No aplica
(*) Para aplicación en post-cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- En el cultivo de vid, aplicar a inicios de infestación, durante las primeras horas del día o al atardecer. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, 01 campaña al año.
- En post-cosecha realizar una aplicación inmediatamente después de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO:

- Después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

- Es compatible con los plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

- No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

- "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones"

PRODUCTO PERUANO

U/05022020 V4



PRECAUCIÓN

