Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Evite la inhalación o el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y si el contacto fuese directo con la piel, lave con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión inducir el vómito y acudir al médico. No inducir al vómito a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE :

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

TOWER®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido cítrico	3.00 %
Acido láctico	4.13 %
Acido ascórbico	2.50 %
Aditivos	csp 1L

Reg. N° 003-SENASA PBA-EV

Distribuidor:

AgroKlinge
A member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000,

Formulado por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes No 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú. Telf.: 612-6565,
Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. EL Derby 254. Int 306.
Santiago de Surco.
Lima-Perú. Telf.: (01) 641-0000

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TOWER es un fungicida sistémico. Afecta la membrana celular de los microorganismos patógenos.

El producto se emplea en el campo, mediante método de aspersión foliar, empleando equipos de aplicación terrestre como pulverizador manual o bomba de mochila.

Modo de empleo: llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **TOWER**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

Se recomienda calibrar el equipo para obtener el gasto de agua adecuado, que permita cubrir el follaje y frutos totalmente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L		
VID	"Oidium"	*Eysiphe necator*	1	N.A	N.A.
	"Pudrición acida"	*Aspergilllus niger Penicillium digitatum*	0.5 - 0.8	N.A	N.A
	"Podredumbre gris"/ "Moho gris"	*Botrytis cinerea*	0.5	N.A	N.A
(*)PALTO	"Antracnosis"	*Colletotrichum gleosporioides*	0.5	N.A	N.A
(*)MANGO	"Antracnosis"	*Colletotrichum gleosporioides*	0.5	N.A	N.A
ARANDANO	"Pudrición gris"	*Botrytis cinerea*	0.5 - 0.6	N.A.	N.A.
(*)MANDARINO	"Moho verde"	*Penicillium digitatum*	0.5	N.A.	N.A.

P.C: Período de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos NA: No aplica
(*) Para aplicación en post-cosecha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el cultivo de vid, aplicar a inicios de infestación, durante las primeras horas del día o al atardecer. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, 01 campaña al año.

En post-cosecha realizar una aplicación inmediatamente después de la cosecha.

PERIODO DE REINGRESO: Después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con los plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto

PRODUCTO PERUANO

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm