LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
-Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente seco, sombreado y ventilado.
-No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
-Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
-Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las primeras 24 horas.
-El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Irritante a la piel y a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Piretroide
-En caso de Intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELEFÓNOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 01-328-7700
ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
-Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
-Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
-Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benéfica.
-No aplicar en época de floración.

WARRIOR® 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE(EC)

Composición:

Permetrina ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Registro PQUA N° 1798-SENASA

Titular de Registro: **POINT ANDINA S.A.**
Calle Loreto Mz A6 Lote 15
Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina.
Lima 12 - Perú.
Tel.: (01) 348 -1018 / 349 - 9609

Formulado por: **Point Agro China Limited**
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu, 214217 China
Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por: **Soluciones Técnicas Del Agro S.A.C.**
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf : (01) 3368645
Fax : (01) 3368299

Soltagro®
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Contenido Neto: 500 ml

Nº Lote
F. de Form.
F. De Venc.

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **WARRIOR 50 EC®** es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión.
- **WARRIOR 50 EC®** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml / cilindro 200 L	L / ha		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	*Heliothis virescens*	200-250	0.4-0.5	0	10
ALFALFA	"Gusano ejército"	*Prodenia eridania*	100	0.2	7	25
CEBOLLA	"Trips"	*Thrips tabaci*	100-150	0.2-0.3	1	0.1
ESPÁRRAGO	"Gusano del turión"	*Copitarsia decolora*	250	0.5	1	1
PÁPRIKA	"Gusano defoliador"	*Spodoptera frugiperda*	200-250	0.4-0.5	3	1
TOMATE	"Polilla"	*Tuta absoluta*	150	0.3	7	1

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC**: Período de Carencia
Volumen de agua recomendado: 400 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación. Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta los 7 días antes de la cosecha. Realizar máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
WARRIOR 50 EC® es compatible con la mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.