

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente seco, sombreado y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Irritante a la piel y a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de Intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 01-328-7700
ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.

WARRIOR[®] 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE(EC)

Composición:

Permetrina 500 g/L
 Aditivos c.s.p 1L

Registro PQUA N° 1798-SENASA

Titular de Registro:



Formulado por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15
 Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina.
 Lima 12 - Perú.
 Tel.: (01) 348 -1018 / 349 - 9609

Point Agro China Limited

Wan Shi Town,
 Yixing, Jiangsu, 214217 China
 Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y Distribuido por: Soluciones Técnicas Del Agro S.A.C.

Softagro[®]
 Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Contenido Neto: 1 L

N° Lote
F. de Form.
F. De Venc.



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **WARRIOR 50 EC[®]** es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión.
- **WARRIOR 50 EC[®]** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml / cilindro 200 L	L / ha		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	200-250	0.4-0.5	0	10
ALFALFA	"Gusano ejército"	<i>Prodenia eridania</i>	100	0.2	7	25
CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	100-150	0.2-0.3	1	0.1
ESPÁRRAGO	"Gusano del turión"	<i>Copitarsia decolora</i>	250	0.5	1	1
PÁPRIKA	"Gusano defoliador"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200-250	0.4-0.5	3	1
TOMATE	"Polilla"	<i>Tuta absoluta</i>	150	0.3	7	1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

Volumen de agua recomendado: 400 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación. Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta los 7 días antes de la cosecha. Realizar máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

WARRIOR 50 EC[®] es compatible con la mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

