

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente seco, sombreado y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Irritante a la piel y a los ojos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de Intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.

WARRIOR® 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Permetrina..... 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1798 - SENASA

Titular del registro: POINT ANDINA S.A

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348-1018

Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LTD
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin
Road, Jiangyin, Jiangsu, China.
Tel. (86-510)80618101

Contenido Neto: 1L

N° de Lote

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

WARRIOR 50 EC® es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión.

WARRIOR 50 EC® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200 L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	200 - 250	0.4 - 0.5	0	10
Alfalfa	Cabalada (gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	100	0.2	7	25
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	100 - 150	0.2 - 0.3	1	0.1
Espárrago	Gusano de tierra	<i>Copitarsia decolora</i>	250	0.5	1	1
Páprika	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200 - 250	0.4 - 0.5	3	1
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta (=Scrobipalpus) absoluta</i>	150	0.3	7	1

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

Volumen de agua recomendado: 400 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación. Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta los 7 días antes de la cosecha. Realizar máximo dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

WARRIOR 50 EC® es compatible con la mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

