29.4 cm x 15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino, no ingerir, ni respirar el polvo o la aspersión.
- Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. - Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón. - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado. - No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. - No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Dinitroaniline.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos lavélos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 **AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD AMBIENTE
TRIPLE LAVADO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos, incluyendo algas y plantas acuáticas y semi-acuáticas. - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROUDER® 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pendimethalin ..... 400 g/L
Solvesso 100 ..... 410 g/L
Aditivos ..... csp 1 L

Registro PQUA N° 1817 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
AGREVO PERUANA S.A.C.
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482

Agrevo
Más valor para tu cultivo

Formulador:
IPROCHEM Co., Ltd
35 th Floor, Guamao Business Mansion,
N°3005 Nanhu Road, Luohu District, Shenzhen,
CHINA.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 L
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
PROUDER 400 EC es un herbicida preemergente sistémico del grupo de las dinitroanilinas que afecta la germinación de las semillas de las malezas, inhibiendo el crecimiento de brotes y raíces, causándole la muerte.
PROUDER 400 EC, se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación, calibrar el equipo previamente. Aplicar al suelo, cuando el campo se encuentre en capacidad de campo, de lo contrario realizar un riego posterior a la aplicación. Usar boquillas de abanico plano.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha		
CEBOLLA	Pata de gallina Verdolaga Yuyo Pega Pega	*Eleusine indica* *Portulaca oleracea* *Amaranthus dubius* *Setaria verticillata*	2.5	60	0.1
PIMIENTO	Chamico Verdolaga	*Datura stramorium* *Portulaca oleracea*	1.0	70	0.05

P.C.: Periodo de Carencia (partes por millón - ppm) **LMR: Límite Máximo de Residuos**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
- Aplicar al suelo, cuando las malezas están en etapa de germinación.
- Realizar como máximo 1 aplicación por campaña. Considerando 2 campañas al año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD: PROUDER 400 EC es compatible con la mayoria de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO