ADAMA

Seedoprid®
70 WS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO DISPERSABLE PARA TRATAR SEMILLAS (WS)

COMPOSICIÓN:
Imidacloprid ..... 700 g/kg
Aditivos ..... c.s.p.1 Kg

Reg. PQUA N° 546 - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
FREGATA S.A.
ul. Grunwaldzka 497
80-309 Gdansk-Oliwa. Poland
Para:
ADAMA Celsius BV Amsterdam NL Schaffhausen Branch.

Contenido neto: **5 Kilogramos**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Cara

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de tratamiento de semillas y siembra.
- Peligroso si es inhalado . Evite respirar el polvo y la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo, tratamiento de semillas, siembra y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
- Evite el contacto con la piel, ojos y boca.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lavar la boca con abundante agua. No dar nada por la boca al paciente si se encuentra inconsciente. Buscar ayuda médica.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, mantenerla abrigada y en reposo. Si la respiración se dificulta, dar oxígeno. Si no hay respiración dar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa afectada y lavar toda el área de la piel expuesta con jabón suave y agua, enjuagar con agua tibia. Buscar atención médica en caso de observar síntomas de intoxicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto. Consulte a un médico.

Nota al médico:

- No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX : 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828
CISPROQUIM: 080-050847; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y deposítela en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No utilice esta bolsa para conservar alimentos o agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o bolsas vacías.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Seedoprid 70 WS es un insecticida sistémico de largo efecto residual que actúa por contacto e ingestión. Esta recomendado para el tratamiento de semillas.

En un recipiente adecuado, hacer la preparación utilizando la dosis recomendada y un volumen de agua equivalente a 20 ml por kg de semilla, agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Orear las semillas a la sombra y una vez secas sembrarlas.

Preparar solo la cantidad que se utilizará en el día. No es conveniente dejar el producto preparado de un día para otro.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Dilución en agua	P.C. (días)	LMR (ppm)
MAÍZ	"Gusano Picador" *Elasmopalpus lignosellus*	5 g/kg de Semilla	20 ml/kg de semilla	N.A.	0.1*

*Grano fresco
P.C.: Periodo de Carencia N.A.: no aplica
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Seedoprid 70 WS al ser un producto para el tratamiento de semillas, es utilizado una sola vez por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada, sin vestimenta de protección, durante 48 horas después de realizada la siembra.

COMPATIBILIDAD

En caso de mezclas con otros productos se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar evaluaciones previas a pequeña escala con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Contracara

Dimensiones 250 mm x 185 mm