

FUNCOB 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Metalaxyl.....	150 g/Kg
Oxicloruro de cobre.....	350 g/kg
Aditivos.....	c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 1833 - SENASA

Titular del Registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú

Formulado por:



Gleba S.A.

Avenida 520 y Ruta Prov. 36,
Melchor Romero, La Plata
Buenos - Aires
Tel (Fax)(0221) 4913062/6093

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto: 1 kg

Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En Contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: fenilamida + Inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de emergencia llamar a **CICOTOX**: 0800-1-3040. **CISPROQUIM**: 080050-847. **ESSALUD**: 117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUNCOB 50 WP es un fungicida de acción sistémica y de contacto que presenta actividad preventiva y curativa, en especial sobre hongos fomicetos. Recomendado para la prevención y control de hiel o ranchar en cultivos de papa.

FUNCOB 50 WP presenta una adecuada residualidad, otorgando un apropiado control en el tiempo. Su actividad sistémica, protege la planta a nivel de follaje y a nivel radicular.

Al usar **FUNCOB 50 WP** se debe hacer una mezcla previa con una pequeña cantidad de gua agitándolo hasta que se homogenice y luego agregar el resto del agua completar el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **FUNCOB 50 WP** (i.a. Metalaxyl + Oxicloruro de Cobre) una aplicación por campaña como máximo.

No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación siempre al follaje.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: **FUNCOB 50 WP** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común con excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(Kg/ha)	(Kg/cil)		
Papa	Hielo fungoso o ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5	0.5	7	0.05 ⁽¹⁾ 5.00 ⁽²⁾
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	1.2	0.4	3	2.00 ⁽¹⁾ 5.00 ⁽²⁾
Vid	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	1.8	0.6	7	1.00 ⁽¹⁾ 5.00 ⁽²⁾
Quinua	Mildiú	<i>Peronospora variabilis</i>	1.13*	-	14	0.05 ⁽¹⁾ N.A. ⁽²⁾
Palto	Tristeza del Palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	8.0	-	30	0.05 ⁽¹⁾ 20 ⁽²⁾
Mandarina	Gomosis del cuello	<i>Phytophthora nicotianae</i>	7.0	-	30	1.00 ⁽¹⁾ 1.00 ⁽²⁾
Cacao	Mancha negra	<i>Phytophthora palmivora</i>	1	0.5	28	0.2 ⁽¹⁾ 50 ⁽²⁾
Arándano	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	3	-	45	0.01 ⁽¹⁾ 25 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia en días.

*Para un gasto de agua de 300 L/ha.

LMR: Limite Máximo de Residuos en ppm.

(1) Metalaxyl (2) Oxicloruro de cobre.

N.A.: No aplica.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

v20190715

