

# FUNCOB 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**Composición:**

Metalaxyl.....150 g/Kg  
Oxicloruro de cobre.....350 g/kg  
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

**Reg. PQUA N° 1833 - SENASA**

**Titular del Registro: HORTUS S.A.**

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú

Formulado por:



Zhejiang Longyou East Anasac  
Crop Science Co., Ltd  
Town South Donghua District,  
Longyou County Zhejiang, China  
Tel: +86 (0) 570-785 5158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.  
Telf: 717-9040 / 717-9041  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**Contenido Neto: 20 kg**

Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## “LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En Contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: fenilamida + Inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de emergencia llamar a **CICOTOX:** 0800-1-3040. **CISPROQUIM:** 080050-847. **ESSALUD:** 117.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FUNCOB 50 WP** es un fungicida de acción sistémica y de contacto que presenta actividad preventiva y curativa, en especial sobre hongos fomicetos. Recomendado para la prevención y control de hielos o rancho en cultivos de papa.

**FUNCOB 50 WP** presenta una adecuada residualidad, otorgando un apropiado control en el tiempo. Su actividad sistémica, protege la planta a nivel de follaje y a nivel radicular.

Al usar **FUNCOB 50 WP** se debe hacer una mezcla previa con una pequeña cantidad de gua agitándolo hasta que se homogenice y luego agregar el resto del agua completar el volumen deseado.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **FUNCOB 50 WP** (i.a. Metalaxyl + Oxicloruro de Cobre) una aplicación por campaña como máximo. No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación siempre al follaje.

**PERIODO DE REINGRESO:** Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:** **FUNCOB 50 WP** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común con excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

## “CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | ENFERMEDAD             |                                | DOSIS   |          | PC (días) | LMR (ppm)                                  |
|-----------|------------------------|--------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------|
|           | Nombre Común           | Nombre Científico              | (Kg/ha) | (Kg/cil) |           |                                            |
| Papa      | Hielo fungoso o rancho | <i>Phytophthora infestans</i>  | 1.5     | 0.5      | 7         | 0.05 <sup>(1)</sup><br>5.00 <sup>(2)</sup> |
| Cebolla   | Mildiú                 | <i>Peronospora destructor</i>  | 1.2     | 0.4      | 3         | 2.00 <sup>(1)</sup><br>5.00 <sup>(2)</sup> |
| Vid       | Mildiú                 | <i>Plasmopara viticola</i>     | 1.8     | 0.6      | 7         | 1.00 <sup>(1)</sup><br>5.00 <sup>(2)</sup> |
| Quinua    | Mildiú                 | <i>Peronospora variabilis</i>  | 1.13*   | -        | 14        | 0.05 <sup>(1)</sup><br>N.A. <sup>(2)</sup> |
| Palto     | Tristeza del Palto     | <i>Phytophthora cinnamomi</i>  | 8.0     | -        | 30        | 0.05 <sup>(1)</sup><br>20 <sup>(2)</sup>   |
| Mandarina | Gomosis del cuello     | <i>Phytophthora nicotianae</i> | 7.0     | -        | 30        | 1.00 <sup>(1)</sup><br>1.00 <sup>(2)</sup> |
| Cacao     | Mancha negra           | <i>Phytophthora palmivora</i>  | 1       | 0.5      | 28        | 0.2 <sup>(1)</sup><br>50 <sup>(2)</sup>    |
| Arándano  | Podredumbre radicular  | <i>Phytophthora cinnamomi</i>  | 3       | -        | 45        | 0.01 <sup>(1)</sup><br>25 <sup>(2)</sup>   |

PC: Periodo de Carencia en días.  
\*Para un gasto de agua de 300 L/ha.

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.  
(1) Metalaxyl (2) Oxicloruro de cobre.

N.A.: No aplica.

v20190715

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

