

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es posible disruptor endocrino.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Converse el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar no transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Imidazole (Prochloraz) y Triazoles (Tebuconazole)**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si la persona está consciente dé de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
  - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se ha detenido, realizar la respiración artificial.
  - En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos durante 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
  - En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Antídoto: no existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 08001-3040 (gratuito)  
ESSALUD: 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilice triturandolo o perforandolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

# KILLER 40 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)

**Composición:**

- Tebuconazole.....133.0 g/L
- Prochloraz.....267.0 g/L
- Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1526 - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
**SHARDA CROPHEM LIMITED**  
Dominic Holm, 29th Road Bandra(w)  
Mumbai – 400050.INDIA  
Teléfono: (91) 22 6678 2800  
Fax: (91) 22 6678 2828

**Contenido Neto: 200 L**

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

Importado y distribuido por:  
**AGROPECUARIA CHIMÚ S.R.L.**  
Av. Cesar Vallejo 310,  
Urb. Palermo - Trujillo  
La Libertad - Perú  
Telf.: 044 - 203962

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- KILLER 40 EW** es un fungicida sistémico preventivo y curativo, tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.
- KILLER 40 EW** se aplica en forma de aspersión foliar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad y en forma preventiva. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	"Mancha purpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5-0.7	14	0.02 (1) 0.05 (2)

L.M.R.: Limite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

- (1) = Tebuconazole
- (2) = Prochloraz

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña por año, con un intervalo de 15 días entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto

**COMPATIBILIDAD:**

**KILLER 40 EW** es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de ácidos y álcalis fuertes. Se recomienda no mezclar con concentrados emulsionables. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha observado síntomas de toxicidad a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

