

CRAWLER® 40% WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Myclobutanil.....400 g/Kg

Aditivos.....c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular de registro:

IPEH

Formulado por:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15, Hubu Street, Nanjing, Jiangsu CHINA
Tel: 86-25-86895000

Importado por:

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Perú
Telefax: (511) 2267332- 2255951
www.ipeh.org.pe



Instituto Peruano del Espárrago
y Hortalizas

CONTENIDO NETO: 25 Kg

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

® = Marca Registrada por IPEH

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está consciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Telefonos de emergencia:
CICOTOX: 0800-1-3040 / ESSALUD: 4237600
CIPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase, inutilicelo titurandolo o perforandolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CRAWLER 40% WP es un fungicida formulado a base de Myclobutanil y que tiene acción sistémica, protectora y curativa. El principio activo es absorbido por las hojas y los tallos y se transporta hacia arriba en la planta hacia áreas de crecimiento nuevo a través del xilema.

Previo a la calibración del equipo de aplicación se debe calcular la cantidad exacta de caldo a preparar y utilizar a fin de no tener remanentes después de la aplicación. Antes de su uso se recomienda agitar bien el producto, la preparación de la pre-mezcla se debe realizar en un recipiente pequeño diluyendo bien el producto, para luego, agregarlo al tanque de aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **CRAWLER 40% WP** (i.a. Myclobutanil) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo. Considerando una campaña por año para los cultivos de pimiento y vid y una frecuencia entre aplicaciones de 14 días o más.

Iniciar la aplicación cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/cil)	Dosis (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.08	-	3	0.5
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.24	14	1

L.M.R: Límite máximo de residuos / **P.C:** Periodo de carencia

