

15 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada en los ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes Y/o semillas.
- Después de usar este producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Dicarboximida
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
 - En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y buscar atención médica.
 - En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf. : 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
CISPROQUIM: :080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelos en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PIRISTROBIN 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Iprodione.....500 g/kg
 Aditivosc.s.p 1kg

Reg. PQUA N° 1835 - SENASA

Titular de Registro:

AGROW SAC
 Calle Los Aperos N° 102. Urb. La Ensenada. La Molina - Lima
 Teléfono: 998128710

Formulado por:

KINYIELD INDUSTRY CO., LIMITED
 Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong-China

Importado y Distribuido por:

AGROW

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un fungicida de contacto y preventivo que actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta. Se diluye la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200	Kg/2Ha		
Ajo	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	-	21	0.2
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.05
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis sp.</i>	-	0.8	14	0.2
Mandarina	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	0.5	30	1
Manzano	Pudrición de las flores	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	-	14	5
Naranja	Podredumbre gris/moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.15	14	0.02
Palto	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.0	30	0.02
Tomate	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	-	7	0.5
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.0	5	0.45

PC: Periodo de carencia

L M R : Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación de **PIRISTROBIN 50 WP** cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. La aplicación debe realizarse previo monitoreo del cultivo. Se puede realizar como máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No debe reingresar al campo antes de las 12 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

PIRISTROBIN 50 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con ácidos, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



30 cm