MEDIDAS: 27.5CM X 14.5CM
06 DE NOVIEMBRE 2023
AG

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Acetamiprid: Neonicotinoide, Buprofezin: Tiadiazin.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico:
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
MONTANA: 419-3000
SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para artrópodos benéficos.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

sanicrop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Buprofezin ..... 250 g/L
Acetamiprid ..... 100 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N°1840 – SENASA
Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú.
Teléfono: (511) 4193000 / e-mail: info@corpmontana.com
www.corpmontana.com

Contenido Neto: 1 L
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de venc.:

MONTANA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **SANICROP** es un insecticida que contiene dos ingredientes activos complementarios para un efectivo control sobre las plagas. Acetamiprid actúa por contacto e ingestión, es translaminar y presenta movimiento sistémico ascendente; trabaja como un análogo de la acetilcolina, la cual produce una excitación nerviosa que provoca la muerte del insecto. Buprofezin es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. En el insecto inhibe la síntesis de quitina afectando el proceso de muda lo que conlleva a la muerte del insecto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	0.20 - 0.25	21	0.01 (*) 0.3 (**)
Pimiento	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	0.20 - 0.30	3	0.3 (*) 2.0 (**)
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus ficus*	0.15 - 0.20	7	0.5 (*) 1 (**)
Mandarino	Queresa coma	*Cornuaspis beckii*	0.20 - 0.25	7	1 (*) 1 (**)
Arándano	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	0.20 - 0.25	14	2 (*) 2.5 (**)
Granado	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	0.20 - 0.25	110	0.01 (*) 0.01 (**)
Arroz	Sogata	*Tagosodes orizicolus*	0.20 - 0.30	100	0.01 (*) 0.01 (**)
Limón	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	0.2 - 0.25	7	0.9 (*) 1.0 (**)
Tomate	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	0.20 - 0.25	14	0.2 (*) 1 (**)

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos Acetamiprid (*), Buprofezin (**)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Se recomienda la aplicación de **SANICROP** al inicio de las infestaciones y cuando se presenten condiciones ambientales que favorezcan la rápida reproducción de la plaga.
- La aplicación debe ser uniforme, asegurando un buen cubrimiento del follaje y frutos en el árbol.
- Se recomienda como máximo 2 aplicaciones por campaña.
- De ser necesario se recomienda repetir la aplicación 14 días después de la primera aplicación.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD
SANICROP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No es compatible con compuestos bases y oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas a la aplicación del producto o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD
SANICROP no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA