

MEDIDAS: 26cm x 13.5cm

FEBRERO 2017

ML

PANTONE 293 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Acetamiprid: Neonicotinoide, Buprofezin: Tiadiazin
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico:**
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CIPROSQUIM: 0800-5-0847
ESSALUD: 0-8010-10-828
MONTANA: 419-3000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos beneficios.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



sanicrop

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Buprofezin 250 g/L
 Acetamiprid 100 g/L
 Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N°1840 – SENASA

Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210, Of. 401, La Molina. Lima - Perú.
Teléfono: (511) 4193000 / e-mail: info@corpmontana.com
www.corpmontana.com

Contenido Neto: 20 L

Lote N°

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SANICROP** es un insecticida que contiene dos ingredientes activos complementarios para un efectivo control sobre las plagas. Acetamiprid actúa por contacto e ingestión, es translinamar y presenta movimiento sistémico ascendente; trabaja como un análogo de la acetilcolina, la cual produce una excitación nerviosa que provoca la muerte del insecto. Buprofezin es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. En el insecto inhibe la síntesis de quitina afectando el proceso de muda lo que conlleva a la muerte del insecto.
- **SANICROP** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte; agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- **SANICROP** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (L/200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|--------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Palto | Queresa | <i>Florinia florinae</i> | 0.20 - 0.25 | 21 | 0.01 (*) 0.05 (**) |
| Pimiento | Mosca blanca | <i>Bemisia tabaco</i> | 0.20 - 0.30 | 3 | 0.3 (*) 2.0 (**) |

PC: Periodo de Carencia / LMR: Limite Máximo de Residuos

Acetamiprid (*), Buprofezin (**)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de **SANICROP** al inicio de las infestaciones y cuando se presenten condiciones ambientales que favorezcan la rápida reproducción de la plaga.
- La aplicación debe ser uniforme, asegurando un buen cubrimiento del follaje y frutos en el árbol.
- Se recomienda como máximo 2 aplicaciones por campaña.
- De ser necesario se recomienda repetir la aplicación 14 días después de la primera aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

SANICROP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No es compatible con compuestos bases y oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas a la aplicación del producto o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

SANICROP no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

