

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto bñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No usar el envase para conservar alimentos o agua.

**PRIMEROS AUXILIOS.**

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación sacar al paciente al aire fresco.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**

**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4**

**FITOCORP SAC: 016522182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezclas de aplicación, luego inútilcelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# UNSTOP 100 EC

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICION:**

Alfacipermetrina..... 100 g/L

Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del registro:

**FITOCORP SAC**

Jr. Las Poncianas N° 147. Dpto 2B. La Molina Vieja. La Molina - Lima

Teléfono: 01-6522182

Formulado por:

**KINYIELD INDUSTRY CO., LIMITED**

Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong

Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 1 L

Lote Nro:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INDICACIONES DE USO Y MANEJO**

UNSTOP 100 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	(Días)	(ppm)
Alfalfa	Gusano ejercito	<i>Prodenia spp</i>	125	14	0.5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0.1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125		
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0.05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0.05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0.05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania spp</i>	125	14	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	150	14	0.1

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda UNSTOP 100 EC aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña /año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al campo antes de las 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

