

Longitud Total 28.9 cm.

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Piretroide
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, sudoración, contracción de las pupilas, mareos, dolores abdominales, vómitos, diarrea, etc. No induzca al vómito ni dé de beber líquidos. Hacer un lavado gástrico, evitando la aspiración del tóxico.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

ANTÍDOTO: No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU 106 y TQC: (01) 612-6565.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

© Marca Registrada

KUNG FU

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

COMPOSICIÓN:

Permethrin 250 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. N° 532-97-AG-SENASA

Titular del Registro e Importador:

Distribuido por:



Tecnología Química y Comercio S.A.

TALEX PERU S.A.C.

Calle René Descartes N° 311, Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú. Telf.: 612-6565. R.U.C. N° 20307150981

Formulado por:

Tagros Chemicals India Ltd.

Jhaver Centre Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road Egmore, Chennai 600 008, India

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: KUNG FU es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, de acción rápida y eficaz contra un amplio rango de insectos plaga. Su baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente, permite hacer aplicaciones pocos días antes de las cosechas. **KUNG FU** se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, uniformemente, procurando cubrir todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/cil. 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
ALGODÓN	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	200	14	0.1
ALFALFA	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	200-250	5	100
AJO, CEBOLLA	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	200-250	3	0.5
BRÓCOLI	"Gusano del brote"	<i>Helulla phidylealis</i>	200-250	2	2
COL	"Gusano de hoja"	<i>Plutella xylostella</i>	200-250	1	5
ESPARRAGO	"Trips"	<i>Frankliniella williamsi</i>	200-250	1	1
FRÍJOL	"Mosca blanca"(*)	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	3	0.1
GARBANZO	"Gusano silbador"	<i>Heliothis virescens</i>	200	3	0.1
MAIZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	2	0.1
PAPA HABAS	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200-300	2 3	0,05 1
TOMATE	"Polilla"	<i>Scrobipalpus absoluta</i>	200-300	2	1
CROTONS	"Mosca blanca"(*)	<i>Aleurotrachelus trachoides</i>	200-250	----	----
GERANIOS	"Gusano medidor"	<i>Pseudaletia includens</i>	200-250	----	----

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

(*) Para un control total de "mosca blanca" se recomienda mezclar con APPLAUD a la dosis de 100 a 200g/cil. 200L

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina. Puede mezclarse con otros herbicidas para complementar la acción de los mismos.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

U. 27862022 V3

Altura Total 13.5 cm.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Longitud Lateral 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

- Cyan
- Magenta
- Amarillo
- Negro
- Pantone 293 C