

16.2 cm

23.4 cm

Ram - Caf[®] 88

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Copper Oxychloride..... 850 g/kg (*)
Aditivos csp 1 kg

(*) Equivalente a 500g/kg de cobre metálico

Reg. N° 296-96-AG-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:



Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C. N° 20307150981

Formulado por:

**SALES Y DERIVADOS DE
DE COBRE S.A.**

Calle 4, Mz-B1, Lote 18,
Urb. Industrial Las Vegas
Puente Piedra. Lima-Perú.
Telf. 548-0205

**Contenido
Neto: 1 Kg**

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

16.2 cm

23.4 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Inorgánico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como gastroenteritis con dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea, mareos, zumbidos de oídos, visión borrosa, etc.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

Atención al cliente: (01) 612-6565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

® Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: RAM CAF 88 es un fungicida cúprico preventivo, con amplio espectro de acción en el control de hongos y bacterias fitopatógenos. Su contenido de cobre, contribuye a corregir las deficiencias de este elemento, principalmente en frutales. **RAM CAF 88** se usa en pulverizaciones en mezcla con agua, aplicándose con equipos de aspersión terrestre. Realizar las aplicaciones agregando un adherente al caldo de aspersión y procurando mojar bien el follaje y frutos. Se puede reforzar su actividad en mezcla con otros fungicidas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	(*)L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	kg/cil 200 L		
CAFÉ	"Roya amarilla"	<i>Hemileia vastatrix</i>	4 - 5	1,0	14	40
	"Mancha del fruto"	<i>Cercospora coffeicola</i>	5 - 8			
CACAO	"Podredumbre del fruto"	<i>Phytophthora palmivora</i>	4 - 5	1,0	14	40
PAPA TOMATE	"Rancha o Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>	3 - 4	0,8	14 7	20
	"Mancha de la hoja"	<i>Cercospora theae</i>	3 - 4	0,8	14	40

P.C.=Periodo de carencia, (*)L.M.R.=Limite máximo de residuos, expresado como cobre metálico.

TRATAMIENTO DE LÍQUENES, MUSGOS Y ALGAS: Aplicar **RAM CAF 88** a la dosis de 600 g/cil sobre ramas, tallos y base de los árboles como manzanos, melocotoneros, cítricos, etc.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 400 - 600 L/ha; Café y cacao: 800 -1000 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando las condiciones medio ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o tan pronto se observen los primeros síntomas. Se puede realizar hasta 2 aplicaciones. En los cultivos de papa, tomate y té repetir la aplicación a los 7 ó 14 días. Para café y cacao, repetir la aplicación a los 30 ó 45 días, según la presión de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Considerando que existen cultivos sensibles al cobre, se recomienda efectuar pruebas previas de fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con compuestos a base de mercurio, thiram, DNOC, polisulfuros alcalinos y sustancias de reacción muy ácida o alcalina. Antes de proceder a su mezcla con otros productos, se recomienda efectuar pequeñas pruebas de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

Producto Peruano

