VACOMIL -PLUS 50®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Metalaxyl : 150 g/kg
Oxicloruro de cobre : 350 g/kg
Aditivos : c.s.p. 1 kg

Registro Nº 994 - 2001 - AG - SENASA

Silvestre
Protección Vegetal

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:

VAPCO LTD.
P.O. Box 17058 Amman 11195, Jordania.

Contenido Neto: **750 g**

Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

VAPCO

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:**

Grupo Químico Metalaxyl: Phenylamide: acylalanine.
Grupo Químico Oxicloruro de Cobre: Inorgánico.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD:411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y depósitelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VACOMIL-PLUS 50® es un fungicida sistémico de formulación polvo mojable compuesto por dos ingredientes activos oxicloruro de cobre (fungicida de contacto) y metalaxyl (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protectivo y curativo. Se recomienda usar **VACOMIL-PLUS 50®** para el control de hongos endoparásitos (oomycetos) causantes de enfermedades en plantas cultivadas.

VACOMIL-PLUS 50® se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje, suelo o cuello de planta según la plaga a controlar, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad en el cultivo y si las condiciones son de alta humedad en el suelo.
- Se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.
- Hacer una segunda aplicación 10 - 14 días después de la primera; sin embargo, si la incidencia del hongo es alta y las condiciones climáticas son frías realizar la segunda aplicación entre 7 y 10 días después.
- Para el cultivo de arándano se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, en 1 campaña al año, en la etapa de desarrollo vegetativo

.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
VACOMIL-PLUS 50® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonataladas, productos mercuriales, thiram, cal, azufre, dithiocarbamatos, agentes oxidantes, ácidos, alcalinos y cobre. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
VACOMIL-PLUS 50® no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
ALCACHOFA	"Mildiu"	*Bremia lactucae*	0.5	1.0	15	0.05
CACAO	"Podredumbre del fruto "	*Phytophthora palmivora*	0.3 - 1.0	-	28	0.1(a) 10(b)
CEBOLLA	"Mildiu"	*Peronospora destructor*	0.35 - 0.5	0.7 - 1.0	15	0.5
MANDARINA	"Gomosis del cuello"	*Phytophthora nicotianae*	1.0	-	7	0.05
PALTO	"Pudrición radicular"	*Phytophthora cinnamomi*	1.0 - 2.0	-	Nd	0.05
PAPA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	0.35 - 0.5	0.7 - 1.0	15	0.05
PÁPRIKA	"Rancha"	*Phytophthora infestans*	0.5*	1.0	7	0.05
	"Hielo azul"	*Phytophthora capsici*	0.5*	1.0	7	0.05
PIMIENTO PIQUILLO	"Hielo azul"	*Phytophthora capsici*	0.75**-1.0	1.5 - 2.0	7	0.05
QUINUA	"Mildiu"	*Peronospora farinosa*	0.5 - 1.0	-	14	0.02
VID	"Mildiu"	*Plasmopara viticola*	-	1.5 - 2.0	66	1 (a) 50 (b)
ARANDANO	"Podedumbre radicular"	*Phytophthora cinnamomi*	-	3.0	45	2 (a) 5.0 (b)

PC: Período de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).
(a) metalaxyl **(b)**oxicloruro de cobre.

* Aplicar dosis de 0.8 kg/200 litros en infestaciones altas **Aplicar dosis de 0.5 kg/200 litros en infestaciones bajas.