



Fitoraz[®]

76% PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Propineb, 700 g/Kg

Cymoxanil, 60 g/Kg

Activos c.s.p., 1Kg

Reg. N° 126-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

Piso 10. San isidro.

Formulado por:

Bayer S.A

Av. Américas 57-52

Bogotá D.C.-Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

San Isidro. Lima-Perú

Telf: 2113800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE**

**Contenido
Neto: 500 g**

Lote N°:

Fecha de

Formulación:

Fecha de

Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Es inofensivo para las abejas. Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua. Almacenarlo en sus envases herméticamente cerrado en lugares adecuados, lejos del alcance de los niños y animales domésticos. Usar máscara, guantes protectores y ropa apropiada al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.

No comer, beber ni fumar durante la aplicación.

No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas), bebidas, forrajeros y medicinas.

Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico:

Propineb: Ditiocarbamatos

Cymoxanil: Cyanoacetamidas.

En caso de presentarse síntomas de intoxicación (vómitos, diarrea, mareos, lipotimia, etc) causados por su mal empleo, negligencia o causa fortuita, acudir de inmediato al médico. Entretanto, provocar el vómito, dándole de beber agua limpia con sal o por medios mecánicos y finalmente un lavado gástrico. Lávese con abundante agua y jabón. Cambiarse de ropa. En caso de irritación de la vista, lavarse con agua por 15 minutos; en caso de intoxicación por inhalación, suministrarle la respiración artificial u oxígeno.

INDICACIONES PARA EL MEDICO :El medico instituirá un tratamiento sintomático para los transtornos digestivos y/o cardiovasculares que puedan presentarse.

ANTÍDOTO: No se ha determinado un antídoto específico.

Están contraindicados, alcohol, grasas y aceites.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN :

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y EN VASES VACIOS :

"Después de usar el contenido de este envase, destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Fitoraz 76% PM es un fungicida que actúa de forma preventiva, curativa y erradicativa del grupo de los ditiocarbamatos.

El ingrediente activo cymoxanil penetra a los tejidos de la planta inhibiendo el desarrollo de los hongos. Adicionalmente previene el desarrollo de las esporas gracias al efecto preventivo del ingrediente activo Propineb.

Se emplea en pulverizaciones, previa mezcla en agua. Hacer una pre-mezcla en un volumen reducido de agua lo más homogénea posible agitándolo continuamente, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Enfermedad Nombre común / Nombre Científico	Dosis			P.C.* (días)	L.M.R.** (ppm)
		kg/ha	mg /cil 200 l	%		
Papa	Hielo fungoso, Rancha o Seca seca <i>Phytophthora infestans</i>	1.5-2.5	500-600	0.25-0.30	14	0.1
Tomate	Hielo fungoso <i>Phytophthora infestans</i>	1.5-2.0	400-500	0.20-0.25	7	5.0
Ajo, cebolla	Mildiu o cenicilla <i>Peronospora destructor</i>	1.5-2.0	400-500	0.20-0.25	8	N/d
Zapallo, Sandía, Melón	Mildiu <i>Peronospora cubensis</i>	1.5-2.0	400-500	0.20-0.25	N/d	N/d
Vid	Mildiu <i>Plasmopara viticola</i>	--	--	0.25-0.375	N/d	0.2

* PC = Período de carencia (en días) **LMR = Límite máximo de residuos (en ppm)
n/d= No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Al constatar los primeros síntomas de la enfermedad, procurando un total cubrimiento de las plantas.

Dosis y frecuencia de aplicación:

Para tratamientos preventivos, aplicar la dosis baja de 1.5 kg/ha, repetir cada 15 días. En tratamientos curativos, con presencia de la enfermedad, aplicar la dosis alta de 2-2.5 kg/ha; repetir cada 8 días.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes foliares. Las mezclas con sustancias de reacción alcalina se deben emplear inmediatamente después de preparadas.

FITOTOXICIDAD: No presenta en dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

