

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, bañese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados..
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al Médico:** No tiene antídoto específico. Todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
SERFI: (01) 710-4068

## BOTRIZIM® 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:  
Carbendazim ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

PQUA N° 1649-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:  
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX S.P.R.L.  
Rue de l'Industrie 201, B-4102  
Ougrée, Bélgica.

Importado y Distribuido por:  
SERFI S.A.  
Av. República de Panamá 2577.  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4068

Contenido Neto: 0.25 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.

**BOTRIZIM® 50 FW** puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVOS     | NOMBRE DE LA ENFERMEDAD     |                        | DOSIS<br>gr/Litro de agua | PC<br>días | LMR<br>ppm |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|
|              | Nombre Común                | Nombre Científico      |                           |            |            |
| Cebolla      | Podredumbre blanca          | Sclerotium cepivorum   | 200                       | 20         | 1          |
| Frijol       | Botrytis                    | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 10         |
| Mandarina    | Podredumbre gris            | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 10         |
| Manzano      | Oidio                       | Asiosphaeria necrotoma | 200                       | 20         | 5          |
| Melocotonero | Oidio                       | Chaenotheca cinerea    | 200                       | 20         | 5          |
| Naranja      | Botrytis                    | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 10         |
| Papa         | Pudrición del tallo         | Fusarium spp.          | 200                       | 20         | 10         |
| Papa         | Rhizoctonia                 | Rhizoctonia solani     | 200                       | 20         | 3          |
| Papa         | Podredumbre coronaria       | Gliocladium musarum    | 200                       | 20         | 5          |
| Salsa        | Oidio                       | Erysiphe cichoracearum | 200                       | 20         | 0.5        |
| Tomate       | Podredumbre gris            | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 5          |
| Vid          | Botrytis                    | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 5          |
| Zapallo      | Podredumbre gris            | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 0.5        |
| Alicachofa   | Oidio                       | Erysiphe ichthyosae    | 200                       | 20         | 0.1        |
| Plenierio    | Botrytis                    | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 0.1        |
| Piquillo     | Botrytis                    | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 0.1        |
| Mango        | Botrytis                    | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 0.1        |
| Plato        | Podredumbre gris            | Botrytis cinerea       | 200                       | 20         | 1.4        |
| Quinua       | Podredumbre morón del tallo | Phoma exigua           | 350                       | 35         | 0.01       |

#### COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

|           |                     |                    |                    |      |
|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|------|
| Ajo       | Fusariosis          | Fusarium oxysporum | 4 mL/kg de semilla | —    |
| Algodón   | Rhizoctonia         | Rhizoctonia solani | 4 mL/kg de semilla | —    |
| Espárrago | Pudrición coronaria | Fusarium oxysporum | 400 mL / 40 mL     | N.A. |
| Gladiolo  | Fusariosis          | Fusarium oxysporum | 400 mL / 40 mL     | —    |
| Papa      | Rhizoctonia         | Rhizoctonia solani | 200 mL / 20 mL     | —    |

PC: Período de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.A.: No aplica.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



Etiqueta: **BOTRIZIM 50 WPx 0.25 L** (Arysta)

Fecha: 22-10-2021

Producto  
Cian

Producto  
Amarillo

Pant. 293 C

Producto  
Magenta

Producto  
Negro

Medida : 7.4 x 22 cm  
Material: Couche brillante de 115 grs.  
Frasco: PEAT

CMYK

